

HoLEP（鈦激光前列腺剷除術）

病人須知 · 適用於任何大小前列腺嘅激光手術

WARWIKI

HoLEP 係針對前列腺增大（良性前列腺增生，BPH）嘅激光手術，透過尿道鏡將造成阻塞嘅內層組織切除 — 唔需要體外切口。最大優點係適用於任何大小嘅前列腺，包括以往需要開刀嘅超大型前列腺，出血少而且效果持久。

關於呢個手術

醫生會將鏡喉尿道伸入，用**鈦激光**將整個內層前列腺（即造成阻塞嘅部分）從外殼剝離 — 就好似將果肉同果皮分開咁。剝離嘅組織會推入膀胱，再切碎取出（**組織絞碎術**，morcellation）。因為整個阻塞部分都切除咗，效果**持久**，極少需要再次治療。

點解選擇 HoLEP

- 適用於**任何大小**嘅前列腺，包括超大型
- **出血少** — 即使服食薄血藥嘅病人通常都可以做
- 置管時間短，效果持久

呢個係專科技術 — 由經驗豐富嘅外科醫生主刀效果最好。

詞彙解釋

HoLEP

鈦激光前列腺剷除術。

BPH

良性（非癌症）前列腺增大。

剷除術（Enucleation）

將整個內層前列腺從外殼完整切除。

鈦激光

用嚟分離及封閉組織、減少出血嘅激光。

組織絞碎術

將剝離嘅組織切碎以便取出。

逆行射精

乾性高潮 — 常見且無害嘅後遺效應。

術後會有咩改變？ 大多數男士都會有強勁持久嘅尿流。同其他前列腺手術一樣，**逆行射精**（乾性高潮）係常見情況。部分男士喺頭幾個星期會有暫時性尿急或少量漏尿，通常都會自行康復；嚴重影響勃起或持續失禁嘅情況並不常見。

點樣準備

- 手術喺**全身麻醉或脊椎麻醉**下進行 — 請跟從禁食及藥物指示。
- 術前需要做**尿液檢查**排除感染。
- 安排人接送；置管時間短。

手術過程及之後

- 1 你係睡著或下半身麻木狀態；術前會打抗生素。
- 2 激光剷除內層前列腺，再切碎取出。
- 3 術後置入尿管，通常約**一日**後拔除；大多數人當日或住院一晚後出院。

頭幾個星期尿液可能帶血，並有少許灼熱或尿急感；如醫生建議，請做盆底運動（凱格爾運動），避免用力及搬重物。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 拔除尿管後**唔能夠小便**
- **大量出血或有血塊**阻礙尿流
- 發燒或發冷
- 漏尿情況喺頭幾個星期內冇改善

要記住嘅三件事

1. HoLEP 透過尿道鏡用激光切除整個阻塞嘅內層前列腺 — 適用於**任何大小**，出血少，效果持久。
2. 術後尿流強勁；乾性（逆行）射精係常見情況，早期尿急及漏尿通常都會康復。
3. 置管時間短。如唔能夠小便、大量出血或發燒，請即刻聯絡醫療團隊。