

植入式脛神經刺激術 (ITNS)

病人須知 · 植喺腳踝附近嘅小型裝置，用嚟治療膀胱過度活躍症

WARWIKI

ITNS 係一個植入腳踝附近嘅小型裝置，透過輕柔刺激脛神經嚟平息膀胱過度活躍症 (OAB) — 包括尿急、頻尿同急迫性漏尿。佢嘅原理同診所做嘅 PTNS（踝部電療）一樣，但因為裝置係植入體內，你可以喺屋企接受治療，唔使每週返診。

點樣運作

脛神經喺腳踝內側，連接控制膀胱嘅同一組脊神經。輕柔刺激呢條神經會向膀胱發出信號，**重新調節**過度活躍嘅膀胱，減少尿急同漏尿。植入裝置幫你自動輸出電脈衝，唔再需要重複返診。呢個方法唔使食藥，亦有全身性副作用。

適合我嗎？

- 適合有 **OAB**（尿急、頻尿、急迫性漏尿）、尤其係藥物無效或有副作用嘅人
- 唔使食藥 — 如果你唔能夠服用膀胱藥物，呢個係好選擇
- 適合覺得診所 **PTNS 有效**但難以每週到診嘅人
- 同骶神經「膀胱起搏器」唔同，大多數 ITNS 裝置**唔需要試驗期**

詞彙解釋

膀胱過度活躍症

膀胱過早收縮引起尿急同頻尿。

脛神經

腳踝附近一條連接膀胱神經系統嘅神經。

神經調節

用輕柔電脈衝平息過度活躍嘅神經。

植入物

透過小手術放入皮膚下嘅小型裝置。

穿戴式配件

部分裝置需要配合可拆除嘅腳踝帶供電及控制。

局部麻醉

令局部位置麻木嘅藥物，讓你保持清醒而唔感到痛。

會唔會痛？ 裝置係喺**短暫門診手術**中植入，會用麻醉藥（局部麻醉）令位置麻木 — 你會保持清醒，應該唔會感到痛，只係有少少壓力感。治療本身感覺係輕微**刺麻感**或腳趾輕輕蜷曲，唔係痛。大多數人當日可以返屋企。

點樣做

- 1 透過腳踝附近嘅**小切口**，喺局部麻醉下將裝置植入脛神經附近 — 通常需時約 **20–35 分鐘**。
- 2 切口縫合後讓傷口愈合；治療通常喺**數週後**開始。
- 3 醫療團隊會設定程式，並教你點樣使用裝置。

兩種裝置類型

- 一種係**完全植入、自備電池** — 唔需要穿戴任何東西或充電；按設定時間自動刺激。
- 另一種**內部冇電池**；你需要佩戴小型**腳踝帶**供電，自行喺屋企進行療程。
- 你嘅外科醫生會告訴你用邊種裝置同點樣使用。

之後

- 腳踝位置可能輕微痠痛或腫脹幾日；保持清潔乾爽，短暫避免劇烈活動，等傷口愈合。
- 效果**逐漸改善** — 好多人有至少一半以上嘅改善，效果可以維持多年。
- 如有需要可以**關閉或取出**。MRI 規定因裝置而異 — 做影像檢查時必須告知醫護人員你有植入物。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 腳踝位置紅腫、有分泌物或發燒（可能係感染）
- 腳踝位置出現新嘅或加重嘅痛楚
- **突然失去效果**或刺激感令人不適

要記住嘅三件事

1. ITNS 係植入腳踝附近嘅小型裝置，平息 OAB — 係 PTNS 嘅居家版，唔使食藥，亦有全身性副作用。
2. 喺短暫門診手術中植入，通常用局部麻醉，大多數裝置**唔需要試驗期**。
3. 效果逐漸改善並可維持多年；如腳踝位置感染、新痛或突然失效，請即刻聯絡醫療團隊。