

Inhibidores de la 5-alfa-reductasa (pastillas que reducen la próstata)

WARWIKI

Información para el paciente · Pastillas que reducen poco a poco una próstata agrandada

Los inhibidores de la 5-alfa-reductasa son pastillas que **reducen poco a poco una próstata agrandada (HPB)**, mejoran el flujo de orina y disminuyen con el tiempo el riesgo de bloqueo urinario y de cirugía de próstata. Los dos son **finasterida (Proscar)** y **dutasterida (Avodart)**. Actúan de forma gradual — deles varios meses.

Cómo funciona

Estas pastillas bloquean la conversión de testosterona en **DHT**, la hormona que impulsa el crecimiento de la próstata. Con menos DHT, la próstata **se reduce poco a poco**, lo que ensancha el canal de la orina. Como reducirse lleva tiempo, el beneficio total aparece en **3 a 6 meses** — no son una solución rápida y a menudo se combinan con un bloqueador alfa de acción rápida.

Qué esperar

- Mejor para próstatas **grandes**; el beneficio crece con los meses.
- Se toman **una vez al día**, a largo plazo.
- Con el tiempo reducen el riesgo de **retención urinaria** y la necesidad de cirugía de próstata.

APRENDA LOS TÉRMINOS

5-ARI

Inhibidor de la 5-alfa-reductasa (finasterida, dutasterida).

HPB

Hiperplasia prostática benigna — una próstata agrandada.

DHT

La hormona que impulsa el crecimiento de la próstata; estas pastillas la bajan.

PSA

Un análisis de sangre de la próstata; estas pastillas reducen el valor a casi la mitad.

Retención urinaria

No poder vaciar la vejiga — el riesgo baja con el tiempo.

Finasterida / dutasterida

Los dos medicamentos de esta clase.

AFECTA SU ANÁLISIS DE PSA Estas pastillas bajan su **nivel de PSA en sangre casi a la mitad**. Eso no le hace daño, pero su médico debe saberlo para leer bien la detección de cáncer de próstata — en general, su resultado de PSA se **duplica** para compararlo con lo normal. Asegúrese de que cada médico sepa que lo toma.

Cómo tomarlo

- **Una vez al día**, a la misma hora; tenga paciencia — el beneficio tarda meses.
- No deje de tomarlo solo porque no nota un cambio al inicio.
- Suele continuarse a largo plazo para mantener la próstata más pequeña.

Seguridad importante

- Las **mujeres embarazadas no deben manipular** tabletas trituradas o partidas (riesgo para un feto masculino); la tableta entera recubierta sí se puede manipular.
- **No done sangre** mientras lo toma ni por un tiempo después de dejarlo.
- Avise a su equipo sobre **cambios de ánimo o depresión**, que se han reportado.

Efectos secundarios comunes

- Menos deseo sexual, dificultad de erección o menos eyaculación
- Sensibilidad o aumento de las mamas
- Algunos hombres reportan efectos sexuales que persisten — comente sus dudas

Llame a su equipo si tiene:

- Un **bulto en la mama**, dolor o secreción del pezón
- **Depresión** nueva o cambios de ánimo
- No puede orinar (busque atención urgente)

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. Los 5-ARI reducen poco a poco la próstata para mejorar el flujo y bajar el riesgo de retención y cirugía — deles 3 a 6 meses.
2. Reducen su **PSA casi a la mitad** — asegúrese de que su médico lo tenga en cuenta al detectar cáncer de próstata.
3. Las embarazadas no deben manipular tabletas partidas, y no done sangre mientras lo toma. Reporte cambios en las mamas o depresión nueva.