

Bloqueadores alfa (para la próstata / flujo urinario)

WARWIKI

Información para el paciente · Pastillas que relajan la salida para mejorar el flujo de orina

Los bloqueadores alfa son pastillas que **relajan el músculo** de la próstata y el cuello de la vejiga para orinar con más facilidad — el primer medicamento habitual para los síntomas urinarios del **agrandamiento de la próstata (HPB)**. Los comunes son **tamsulosina (Flomax)**, **alfuzosina**, **silodosina**, **doxazosina** y **terazosina**. Actúan rápido, pero no reducen la próstata.

Cómo funciona

Una próstata agrandada aprieta el canal de la orina. Los bloqueadores alfa **relajan ese músculo en la salida de la vejiga**, dando un chorro más fuerte y menos titubeo, esfuerzo y orina entrecortada. Tratan los **síntomas** — no cambian el tamaño de la próstata, así que el beneficio dura solo mientras los toma.

Qué esperar

- La mejoría suele ser **rápida** — en días a un par de semanas.
- A menudo se toman **una vez al día**; la tamsulosina se toma unos **30 minutos después de la misma comida** cada día.
- La doxazosina/terazosina se inician **al acostarse** y se aumentan despacio para limitar el mareo.
- Pueden combinarse con un medicamento que reduce la próstata en próstatas más grandes.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Bloqueador alfa

Pastilla que relaja el músculo en la salida de la vejiga.

HPB

Hiperplasia prostática benigna — una próstata agrandada.

Cuello de la vejiga

La salida muscular donde la vejiga se une a la uretra.

Eyacuación retrógrada

El semen va hacia atrás a la vejiga — inofensivo, pero con menos o nada de fluido.

Hipotensión ortostática

Mareo por una baja de presión al ponerse de pie.

IFIS

Iris flácido durante la cirugía de cataratas — avise a su oftalmólogo.

¿VA A TENER CIRUGÍA DE CATARATAS? Avise a su oftalmólogo que toma (o tomó alguna vez) un bloqueador alfa — puede dejar el iris “flácido” durante la cirugía de cataratas (IFIS), y él lo tendrá en cuenta. Esto importa **aunque ya haya dejado** el medicamento.

Cómo tomarlo

- Tómelo **a la misma hora cada día** según le indiquen (tamsulosina ~30 min después de una comida).
- Con doxazosina/terazosina, tome la **primera dosis al acostarse** y levántese despacio — la baja de presión de la primera dosis puede causar mareo.
- No duplique de golpe si olvida una dosis.

Seguridad importante

- Póngase de pie **despacio**, sobre todo al inicio, para evitar mareo o desmayo.
- Tenga cuidado al combinar con **inhibidores de la PDE5** o medicinas para la presión (más mareo).
- La **eyaculación retrógrada** (eyaculación seca o reducida) es común con tamsulosina/silodosina — inofensiva y reversible si la deja.

Efectos secundarios comunes

- Mareo o aturdimiento; cansancio
- Nariz tapada
- Eyaculación reducida o “seca”

Llame a su equipo o busque atención si tiene:

- **Desmayo** o mareo intenso
- Latidos rápidos o fuertes, o dolor en el pecho
- **No puede orinar nada** (busque atención urgente)

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. Los bloqueadores alfa relajan rápido la salida de la vejiga para mejorar el flujo en la HPB — alivian los síntomas, pero no reducen la próstata.
2. Levántese despacio al principio (mareo), y sepa que una eyaculación seca o reducida es común e inofensiva.
3. Avise siempre a su **oftalmólogo** antes de la cirugía de cataratas que toma o tomó un bloqueador alfa.