

Anticolinérgicos (para la vejiga hiperactiva)

Información para el paciente · Pastillas que calman una vejiga que se contrae demasiado pronto

WARWIKI

Los anticolinérgicos (también llamados antimuscarínicos) son pastillas que calman una **vejiga hiperactiva** y reducen las ganas repentinas, las idas frecuentes y el escape por urgencia. Los más comunes son **oxibutinina, tolterodina, solifenacina, fesoterodina, darifenacina y trospio** (la oxibutinina también viene en parche o gel). Son una opción eficaz y de uso prolongado.

Cómo funciona

Estas pastillas **bloquean las señales** que hacen que el músculo de la vejiga se contraiga, así lo hace con menos frecuencia y menos de repente durante el llenado. El resultado es menos urgencia y menos idas. Tratan los síntomas mientras las toma; el beneficio aumenta en unas semanas.

Qué esperar

- La mejoría suele tardar **unas semanas** — dele tiempo antes de juzgarla.
- Se toma **una vez al día** en casi todas las formas de liberación prolongada.
- Las **pastillas de liberación prolongada, el parche o el gel** suelen causar menos sequedad de boca que la oxibutinina de acción corta.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Vejiga hiperactiva (VH)

Urgencia y orina frecuente porque la vejiga se contrae demasiado pronto.

Anticolinérgico / antimuscarínico

La clase de pastillas que calman el músculo de la vejiga.

Sequedad de boca

El efecto secundario más común.

Carga anticolinérgica

El efecto sumado de varios de estos medicamentos — importante en adultos mayores.

Agonista beta-3

Otra pastilla para la VH con menos de estos efectos (una alternativa).

Glaucoma de ángulo estrecho

Una afección del ojo en la que suelen evitarse estas pastillas.

UNA NOTA PARA ADULTOS MAYORES En adultos mayores, estos medicamentos pueden afectar la **memoria y el pensamiento**, y el uso prolongado de varios anticolinérgicos juntos se ha asociado con problemas cognitivos. Si le preocupa, un **agonista beta-3** es otra pastilla para la VH sin ese efecto — pregunte a su equipo.

Cómo tomarlo

- Tome **una vez al día** según le indiquen; no lo deje antes solo porque la urgencia no haya cedido del todo.
- Si la sequedad de boca le molesta, pregunte por una **forma de liberación prolongada, el parche o el gel**.
- Combínelo con entrenamiento de la vejiga y ejercicios del suelo pélvico para el mejor resultado.

Seguridad importante

- Suele **evitarse en glaucoma de ángulo estrecho no tratado** — avise a su equipo de afecciones del ojo.
- Use precaución si tiene **dificultad para vaciar la vejiga**, estreñimiento importante o ciertas afecciones del estómago.
- Pueden reducir el sudor — tenga cuidado en el **calor** para no recalentarse.

Efectos secundarios comunes

- **Sequedad de boca y estreñimiento** (lo más común)
- Visión borrosa, ojos secos
- Somnolencia; en adultos mayores, confusión

Llame a su equipo si tiene:

- **No puede orinar** o siente que no vacía
- **Confusión nueva o problemas de memoria**, sobre todo si es mayor
- Estreñimiento intenso, o **dolor/enrojecimiento del ojo con visión borrosa**

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. Los anticolinérgicos calman la vejiga hiperactiva y alivian la urgencia, la frecuencia y el escape por urgencia; deles unas semanas.
2. La sequedad de boca y el estreñimiento son comunes — las formas de liberación prolongada, el parche o el gel ayudan.
3. En adultos mayores pueden afectar el pensamiento; un agonista beta-3 es una alternativa. Llame si no puede orinar o tiene confusión nueva.