

Agonistas beta-3 (para la vejiga hiperactiva)

WARWIKI

Información para el paciente · Una pastilla más nueva con menos sequedad de boca

Los agonistas beta-3 son una clase más nueva de pastillas para la **vejiga hiperactiva** — urgencia, idas frecuentes y escapes por urgencia. Relajan la vejiga para que retenga más y causan **menos sequedad de boca, estreñimiento y efectos en la memoria** que los anticolinérgicos más antiguos. Son dos: **mirabegrón (Myrbetriq)** y **vibegrón (Gemtesa)**.

Cómo funciona

Activan los **receptores beta-3** de la pared de la vejiga, que **relajan el músculo de la vejiga** mientras se llena. Con una vejiga más calmada durante el llenado, tiene menos urgencias súbitas y menos idas — por una vía distinta a la de los anticolinérgicos.

Qué esperar

- El beneficio aumenta en **unas semanas**; se toma **una vez al día**.
- Suele tolerarse **bien** — poca o ninguna sequedad de boca.
- Buena opción para **adultos mayores** o para quien tuvo sequedad u otros efectos con los anticolinérgicos.
- A veces se combina con un anticolinérgico para síntomas rebeldes.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Vejiga hiperactiva (VH)

Urgencia y orinar con frecuencia porque la vejiga se contrae demasiado pronto.

Agonista beta-3

Pastilla que relaja la vejiga a través de los receptores beta-3.

Mirabegrón / vibegrón

Las dos medicinas de esta clase.

Anticolinérgico

La clase de pastilla más antigua para la VH; los agonistas beta-3 evitan muchos de sus efectos.

Presión arterial

El mirabegrón puede subirla un poco — se vigila.

¿POR QUÉ ELEGIR ESTA EN VEZ DE LAS ANTIGUAS? Los agonistas beta-3 funcionan casi igual que los anticolinérgicos para la vejiga hiperactiva, pero con **mucha menos sequedad de boca y estreñimiento**, y sin las preocupaciones de memoria — por eso suelen preferirse, sobre todo en adultos mayores. Lo principal a vigilar es la presión arterial.

Cómo tomarla

- Tome **una vez al día** según indicación; dele unas semanas para hacer efecto.
- Combínela con entrenamiento de la vejiga y ejercicios del suelo pélvico para mejores resultados.
- Mantenga su seguimiento para que su equipo revise el efecto y su presión arterial.

Seguridad importante

- **El mirabegrón puede subir la presión arterial** — se vigila, y se evita si su presión está muy alta o sin control. (El vibegrón casi no afecta la presión.)
- Informe a su equipo de otras medicinas — el mirabegrón puede afectar el nivel de algunos fármacos.
- Como con todo tratamiento de la VH, avise si le cuesta vaciar.

Efectos secundarios comunes

- Suelen ser leves — dolor de cabeza, nariz tapada
- Subida de la presión arterial (sobre todo el mirabegrón)
- Infección urinaria o algo de estreñimiento

Llame a su equipo si tiene:

- **Presión arterial muy alta** o un dolor de cabeza fuerte
- **No puede orinar** o siente que no vacía
- Hinchazón de cara, labios o lengua, o dificultad para respirar (alergia rara) — busque atención de urgencia

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. Los agonistas beta-3 relajan la vejiga para aliviar los síntomas de vejiga hiperactiva, con **mucha menos sequedad de boca** que las pastillas antiguas.
2. Suelen ser buena opción para adultos mayores o tras efectos de los anticolinérgicos; deles unas semanas.
3. El mirabegrón puede subir la presión — mantenga sus controles. Llame si no puede orinar o su presión sube mucho.