

Bótox para la vejiga (control de la vejiga)

WARWIKI

Información para el paciente · Inyecciones que calman una vejiga hiperactiva

El Bótox para la vejiga trata una **vejiga hiperactiva** — urgencia, idas frecuentes y escapes con urgencia — que no mejoró lo suficiente con cambios de estilo de vida y medicinas. Se inyectan cantidades muy pequeñas de toxina botulínica en el músculo de la vejiga con un pequeño endoscopio para relajarlo. El efecto aparece en 1–2 semanas y suele durar unos 6 meses.

Cómo funciona

Un músculo hiperactivo de la vejiga se contrae cuando no debe. El Bótox **relaja ese músculo**, así deja de contraerse sin control — reduciendo la urgencia, la frecuencia y los escapes por urgencia. No actúa de inmediato; notará mejoría en **1–2 semanas**.

¿Es seguro?

Sí, está bien establecido. Lo más importante: al relajar la vejiga, el Bótox a veces hace **más difícil vaciarla por completo** — unas pocas personas necesitan hacer **autocateterismo temporal** hasta que el efecto pase. Por eso, debe estar dispuesto y poder aprender el autocateterismo si hace falta. Otros efectos incluyen infecciones urinarias y sangre breve en la orina.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Vejiga hiperactiva

Urgencia y orina frecuente porque la vejiga se contrae demasiado pronto.

Toxina botulínica (Bótox)

Medicina que relaja el músculo al inyectarse.

Detrusor

El músculo de la vejiga que se inyecta.

Cistoscopia

La cámara delgada que aplica las inyecciones.

Autocateterismo

Pasar un tubo delgado para vaciar la vejiga; a veces hace falta por un tiempo.

Orina residual posmiccional

Orina que queda tras orinar — se revisa tras el procedimiento.

¿LE DOLERÁ? Primero se pone medicina anestésica en la vejiga, así la mayoría solo siente una leve presión durante las inyecciones rápidas. Suele ser un **procedimiento de consultorio con anestesia local**, dura unos 10–15 minutos y se va a casa enseguida.

Cómo prepararse

- Un **análisis de orina** antes para descartar infección.
- Puede recibir un **antibiótico** alrededor del procedimiento.
- Avise a su equipo si toma **anticoagulantes** y prepárese para aprender autocateterismo por si acaso.

Qué sucede

- 1 Se coloca líquido anestésico en la vejiga.
- 2 Se pasa un **cistoscopio** delgado por la uretra.
- 3 Se inyecta Bótox en la pared de la vejiga en varios puntos pequeños.
- 4 Se retira el endoscopio — todo dura unos 10–15 minutos.

Después

- Es normal ardor leve o algo de sangre en la orina por un día o dos.
- La mejoría aparece en 1–2 semanas; el efecto dura unos 6 meses y se puede **repetir**.

Llame a su equipo si tiene:

- **No puede orinar** o siente que no se vacía
- Fiebre o escalofríos (posible infección)
- Sangrado abundante o coágulos en la orina
- Ardor que empeora tras unos días

Bueno saber

- Su vaciado suele **revisarse** tras el procedimiento.
- Si se planean dosis repetidas, se separan por varios meses.

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. El Bótox relaja el músculo hiperactivo de la vejiga y alivia la urgencia, la frecuencia y los escapes por urgencia; actúa en 1–2 semanas y dura ~6 meses.
2. Es un procedimiento de consultorio rápido con anestesia; la principal desventaja es que algunas personas necesitan autocateterismo temporal.
3. Llame de inmediato si no puede orinar o le da fiebre tras el procedimiento.