

Estimulación implantable del nervio tibial (ITNS)

Información para el paciente · Un pequeño dispositivo implantado cerca del tobillo para la vejiga hiperactiva

WARWIKI

La ITNS es un pequeño dispositivo colocado cerca del tobillo que estimula suavemente el **nervio tibial** para calmar la **vejiga hiperactiva** — urgencia, idas frecuentes y escapes de urgencia. Funciona como la PTNS (el tratamiento en el consultorio en el tobillo), pero como el dispositivo está **implantado**, usted recibe la terapia **en casa** en vez de volver para citas semanales.

Cómo funciona

El nervio tibial, cerca del tobillo interno, se conecta con los mismos nervios espinales que controlan la vejiga. Estimularlo con suavidad envía señales que **reentrenan y calman** la hiperactividad de la vejiga — reduciendo la urgencia y los escapes. El implante envía esos pulsos por usted, así ya no necesita citas repetidas. No hay medicinas ni efectos secundarios en todo el cuerpo.

¿Es adecuado para mí?

- Buena opción para la **vejiga hiperactiva** (urgencia, frecuencia, escapes de urgencia), sobre todo si las medicinas no funcionaron o causaron efectos secundarios
- Sin medicamentos — útil si no puede tomar medicinas para la vejiga
- A menudo elegida por quienes hallaron la **PTNS en el consultorio útil** pero difícil de mantener cada semana
- A diferencia del “marcapasos de la vejiga” sacro, la mayoría de los dispositivos ITNS no necesitan **periodo de prueba** previo

APRENDA LOS TÉRMINOS

Vejiga hiperactiva

Urgencia y orina frecuente porque la vejiga se contrae antes de tiempo.

Nervio tibial

Un nervio cerca del tobillo que se enlaza con los nervios de la vejiga.

Neuromodulación

Usar pulsos eléctricos suaves para calmar nervios hiperactivos.

Implante

Un pequeño dispositivo colocado bajo la piel en un procedimiento corto.

Dispositivo portátil

Una banda de tobillo removible que da energía y controla algunos dispositivos.

Anestesia local

Medicina para adormecer la zona sin dolor mientras está despierto.

¿LE DOLERÁ? El dispositivo se coloca en un **procedimiento corto ambulatorio** con medicina para adormecer (anestesia local) — está despierto pero no debería sentir dolor, solo algo de presión. La terapia se siente como un leve **hormigueo** o un suave doblar del dedo del pie, no dolor. La mayoría se va a casa el mismo día.

Cómo se hace

- 1 Por un **corte pequeño cerca del tobillo**, el dispositivo se coloca junto al nervio tibial — casi siempre con anestesia local, en unos **20–35 minutos**.
- 2 La zona se cierra y se deja sanar; la terapia suele empezar **unas semanas después**.
- 3 Su equipo programa los ajustes y le muestra cómo funciona el dispositivo.

Los dos tipos de dispositivo

- Un tipo está **totalmente implantado y usa su propia batería** — nada que llevar ni cargar; estimula solo en un horario fijo.
- El otro **no tiene batería dentro**; usted lleva una pequeña **banda de tobillo** que le da energía y le permite hacer sus sesiones en casa.
- Su cirujano le dirá qué dispositivo recibirá y cómo usarlo.

Después

- Molestia leve o hinchazón en el tobillo unos días; manténgalo limpio y seco y evite el esfuerzo fuerte un tiempo mientras sana.
- El beneficio **aumenta con las semanas** — muchos logran al menos la mitad o más de mejoría, y el efecto dura años.
- Se puede **apagar o retirar** si hace falta. Las reglas de resonancia varían según el dispositivo — avise siempre al equipo de imágenes que tiene un implante.

Llame a su equipo si tiene:

- Enrojecimiento, hinchazón, secreción o fiebre (posible infección)
- Dolor nuevo o peor en la zona del tobillo
- Una **pérdida repentina del beneficio** o estimulación incómoda

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. La ITNS es un pequeño implante cerca del tobillo que calma la vejiga hiperactiva — la versión en casa de la PTNS, sin medicinas y sin efectos secundarios en todo el cuerpo.
2. Se coloca en un procedimiento corto ambulatorio, casi siempre con anestesia local, y la mayoría de los dispositivos no necesitan **periodo de prueba** previo.
3. El beneficio aumenta con las semanas y dura años; llame por infección en el tobillo, dolor nuevo o pérdida repentina del efecto.