

Inyecciones intracavernosas (inyecciones en el pene para la DE) **WARWIKI**

Información para el paciente · Un tratamiento autoinyectado para la disfunción eréctil

La inyección intracavernosa (IIC) es un tratamiento para la disfunción eréctil en el que usted coloca un poco de medicina en el costado del pene con una aguja muy fina para lograr una erección. Se usa cuando las pastillas para la erección no funcionan o no son adecuadas. Parece intimidante, pero la aguja es muy pequeña, casi no se siente, y es uno de los tratamientos no quirúrgicos más confiables.

Acerca de este tratamiento

La medicina (a menudo **alprostadil**, o una mezcla preparada llamada **bimix** o **trimix**) relaja los vasos sanguíneos de las cámaras de la erección para que entre la sangre. Funciona **tenga o no excitación**, y suele producir una erección en unos **5 a 15 minutos** que dura cerca de 30 a 60 minutos.

- La **primera dosis se aplica en el consultorio** para hallar la cantidad correcta y confirmar que es segura para usted.
- Luego se le enseña a **inyectarse en casa**.
- Suele ser eficaz incluso cuando las pastillas fallaron, incluso después de cirugía de próstata.

¿Es seguro?

Para la mayoría, sí — cuando la dosis se ajusta con cuidado. El riesgo más importante es una **erección prolongada (priapismo)** de más de 4 horas, que es una emergencia. Otros efectos: dolor leve, moretones ocasionales y, con el tiempo, zonas duras (cicatrices) en los sitios de inyección — rotar los sitios ayuda a evitarlo.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Disfunción eréctil (DE)

Dificultad para lograr o mantener una erección firme para el sexo.

Intracavernoso

Dentro de las cámaras de la erección (cuerpos cavernosos) del pene.

Alprostadil

Una inyección común de una sola medicina para la DE.

Trimix / bimix

Una mezcla preparada de dos o tres medicinas para inyectar.

Titulación

Hallar su dosis correcta, casi siempre empezando en el consultorio.

Priapismo

Una erección de más de 4 horas — una emergencia médica.

Inhibidores de la PDE5

Pastillas para la erección (como sildenafil); la IIC es una opción cuando fallan.

¿LE DOLERÁ? La aguja es muy fina y entra por el costado del pene, donde casi siempre solo se siente un pequeño pinchazo — no en la parte superior ni inferior, que son sensibles. Un dolor leve después es común, sobre todo con alprostadil. Su equipo vigilará la primera dosis para que sea cómoda y segura.

Cómo usarlo con seguridad

- 1 **Primera dosis en el consultorio** para fijar la cantidad correcta — nunca aumente la dosis por su cuenta.
- 2 Inyecte en el **costado del pene** (cerca de las 3 o las 9 del reloj); **evite la parte superior e inferior**, y **cambie de lado** cada vez.
- 3 Presione firme el sitio un par de minutos después para reducir los moretones.
- 4 Úselo **solo según lo indica su equipo** — por lo común no más de una vez en 24 horas o unas 3 veces por semana.

Cómo prepararse

- Guarde la medicina según lo indicado (algunas mezclas necesitan refrigeración).
- Avise a su equipo si usa **anticoagulantes** y de cualquier problema del corazón.
- Lleve a su pareja a la enseñanza si eso lo ayuda a sentirse cómodo.

Busque atención de emergencia si:

- Una erección dura **más de 4 horas** (priapismo) — vaya a urgencias; esperar puede causar daño permanente
- Tiene dolor intenso, sangrado abundante o signos de infección en el sitio
- Se siente desmayado o tiene dolor en el pecho tras una dosis

Bueno saber

- Lleve consigo la dosis y el horario que su equipo le indique.
- Informe cualquier bulto duro nuevo o curvatura del pene.

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. La IIC usa una aguja muy fina para colocar medicina en el costado del pene, con una erección confiable en unos 5 a 15 minutos — útil cuando las pastillas no funcionan.
2. Su primera dosis se fija en el consultorio; nunca suba la dosis usted mismo, alterne los lados de inyección y no pase el límite indicado.
3. Una erección de **más de 4 horas es una emergencia** — vaya a urgencias de inmediato.