

Balón con medicamento Optilume

Información para el paciente · Un tratamiento con balón y medicamento para una estrechez uretral

WARWIKI

Optilume es un tratamiento mínimamente invasivo para una estrechez de la uretra — el conducto que lleva la orina fuera del cuerpo. Un balón especial ensancha con suavidad la zona estrecha y, al mismo tiempo, libera un medicamento en la pared para evitar que vuelva a cerrarse por cicatrices. No hay cortes ni incisiones externas.

Acerca de este procedimiento

Una **estrechez** uretral es un segmento cicatricial y estrecho que reduce el chorro de orina. Solo estirla o cortarla a menudo permite que vuelva a estrecharse. Optilume hace dos cosas a la vez:

- Un **balón ensancha** el segmento cicatricial.
- Un **recubrimiento de medicamento (paclitaxel)** del balón pasa al tejido para frenar que la cicatriz se forme otra vez.

Es una buena opción para ciertas **estrecheces recurrentes** en la uretra bulbar (bajo el escroto) que miden **menos de unos 3 cm** y reaparecieron tras un estiramiento o corte previo. Es más duradero que una dilatación simple, pero **no es lo mismo que la uretroplastia** (reparación abierta), que es la opción más duradera. Su cirujano le explicará dónde encaja en su caso.

¿Es seguro?

Optilume es mínimamente invasivo y se hace por la uretra, a menudo de forma ambulatoria. Suele tolerarse bien. La dosis del medicamento es pequeña y queda local. Los riesgos incluyen sangre en la orina o el semen, ardor breve, una infección urinaria y que la estrechez reaparezca con el tiempo.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Uretra

El conducto que lleva la orina fuera del cuerpo.

Estrechez

Un punto cicatricial y estrecho de la uretra que reduce el chorro de orina.

Uretra bulbar

La parte de la uretra bajo el escroto, donde mejor funciona este tratamiento.

Balón con medicamento

Un balón que ensancha la estrechez y libera medicamento en la pared.

Paclitaxel

El medicamento del balón que ayuda a evitar que la cicatriz reaparezca.

Dilatación

Ensachar una estrechez — aquí, con el balón.

Cistoscopia

Una cámara delgada para hallar y revisar la estrechez.

Sonda

Un tubo suave que se coloca en la uretra por poco tiempo tras el procedimiento.

¿LE DOLERÁ? El procedimiento se hace con anestesia o sedación, así que no siente nada durante él. Después, espere ardor leve, una molestia pélvica o en el pene y algo de sangre en la orina o el semen por poco tiempo. Suele colocarse una sonda brevemente. Es un procedimiento corto, a menudo con alta el mismo día.

Cómo prepararse (antes del procedimiento)

- Siga sus **indicaciones de anestesia o sedación** (ayuno y qué medicamentos suspender, incluidos los anticoagulantes).
- Un **análisis de orina** revisa si hay infección — una infección debe tratarse primero.
- **Organice quién lo lleve a casa** y prevea una sonda por poco tiempo.

Avisé a su equipo con anticipación si usted:

- Toma un **anticoagulante** o tiene una infección urinaria actual
- Planea **tener un hijo** — por el medicamento, le pedirán usar condón y no buscar embarazo durante el periodo que indique su equipo

Qué sucede durante el procedimiento

- 1 Está dormido o sedado, y un cistoscopio confirma el largo y la ubicación de la estrechez.
- 2 Se pasa un alambre delgado a través de la estrechez y se estira la zona lo suficiente para el balón.
- 3 El balón con medicamento se centra sobre la cicatriz y se infla un tiempo fijo, liberando el medicamento.
- 4 Se retiran el balón y el cistoscopio, y se coloca una sonda por poco tiempo.

Después del procedimiento

- La sonda se retira tras **poco tiempo**; su equipo le dirá cuándo.
- Espere **ardor leve y orina o semen rosados** por varios días. Beber más agua ayuda.
- **Evite el esfuerzo físico** un tiempo y acuda a su revisión de chorro o síntomas.
- **Use condón** el periodo que le indique su equipo, por el medicamento.

Llame a su equipo o busque atención si tiene:

- Fiebre o escalofríos
- **No puede orinar**, sobre todo tras retirar la sonda
- Sangrado abundante o coágulos en la orina
- Dolor que empeora en vez de mejorar

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. Optilume ensancha una estrechez uretral con un balón y libera medicamento para evitar que se cierre por cicatrices — una opción endoscópica, no un sustituto de la uretroplastia abierta.
2. Para prepararse: siga las indicaciones de ayuno y medicamentos, trate primero cualquier infección, organice un traslado y avise a su equipo si planea tener un hijo.
3. Ardor leve y algo de sangre en la orina o el semen por varios días es normal. Use condón el tiempo indicado y llame si hay fiebre, sangrado abundante o no puede orinar.