

Inhibidores de la PDE5 (pastillas para DE y próstata)

Información para el paciente · Pastillas para la disfunción eréctil — y síntomas urinarios de la próstata

WARWIKI

Los inhibidores de la PDE5 son pastillas para tratar la **disfunción eréctil (DE)**, y uno de ellos (tadalafilo) también alivia los síntomas urinarios del **agrandamiento de la próstata**. Los comunes son **sildenafil (Viagra)**, **tadalafilo (Cialis)**, **vardenafilo** y **avanafilo**. Ayudan al cuerpo a lograr una erección en respuesta a la excitación — no la crean por sí solos.

Cómo funciona

Estas pastillas **relajan los vasos sanguíneos** del pene para que entre la sangre. Es clave: actúan **solo con estimulación sexual** — usted aún necesita sentir excitación; la pastilla no causa una erección automática. El tadalafilo también relaja el músculo de la próstata y la vejiga, por eso una dosis baja diaria puede mejorar el flujo de orina.

Qué esperar

- **Sildenafil / vardenafilo / avanafilo** actúan en unos **30–60 minutos** y duran unas horas.
- **Tadalafilo** dura más (hasta ~36 horas — la opción de “fin de semana”) o se toma en **dosis baja diaria**.
- Una comida pesada y grasosa puede **retrasar** el sildenafil; el tadalafilo no se afecta por la comida.
- Puede tomar varios intentos hallar la dosis y el momento correctos.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Inhibidor de la PDE5

La clase de pastillas (sildenafil, tadalafilo, etc.) para la DE.

Disfunción eréctil (DE)

Dificultad para lograr o mantener una erección firme para el sexo.

Nitratos

Medicinas para el corazón/dolor de pecho que NUNCA deben combinarse con estas pastillas.

Según necesidad vs. diaria

Tomada antes del sexo, o una dosis baja cada día.

HPB

Agrandamiento de la próstata; el tadalafilo trata sus síntomas urinarios.

Priapismo

Una erección de más de 4 horas — una emergencia médica.

LA REGLA MÁS IMPORTANTE Nunca tome estas pastillas con **nitratos** (como nitroglicerina o isosorbida para el dolor de pecho) ni con “poppers” (nitrito de amilo). La combinación puede causar una **caída de la presión arterial peligrosa, incluso mortal**. Diga a cada profesional que toma un inhibidor de la PDE5.

Cómo tomarla

- Tómela **como se le indique** — antes del sexo (según necesidad) o a diario, según su receta.
- Para el sildenafil según necesidad, tómelo con el **estómago casi vacío** para un efecto más rápido.
- No tome más de una dosis en 24 horas, salvo indicación.

Seguridad importante

- **Nada de nitratos ni poppers** — nunca (vea arriba).
- Precaución con los **bloqueadores alfa** y otras medicinas para la presión (pueden sumar mareo) — su equipo los espaciará o ajustará.
- Si tiene **enfermedad cardíaca importante**, confirme con su médico que el sexo y estas pastillas son seguros para usted.
- Limite el **alcohol**, que aumenta el mareo.

Efectos secundarios comunes

- Dolor de cabeza, **rubor** facial, nariz tapada, indigestión
- Dolor de espalda o muscular (más con tadalafilo)
- **Tinte azulado** temporal en la vista (sildenafil/vardenafilo)

Busque atención de emergencia si tiene:

- Una erección de **más de 4 horas** (priapismo)
- **Pérdida súbita de visión o audición** — suspenda la pastilla y busque atención
- **Dolor de pecho**, desmayo o mareo intenso

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. Los inhibidores de la PDE5 ayudan a la erección **con excitación** (no actúan solos); el tadalafilo también ayuda con síntomas urinarios de la próstata.
2. **Nunca los combine con nitratos ni poppers** — la caída de presión puede ser mortal.
3. Busque atención de emergencia ante una erección de más de 4 horas o pérdida súbita de visión/audición.