

Uretrostomía perineal

WARWIKI

Información para el paciente · Una nueva abertura permanente para la orina en el perineo

La uretrostomía perineal crea una nueva abertura permanente para la orina en el perineo — la zona entre el escroto y el ano. Se usa cuando la uretra está demasiado estrecha, cicatrizada o dañada para repararla. Después, usted orina sentado por esta abertura en vez de por la punta del pene. Esta hoja explica cómo funciona, cómo prepararse y qué esperar.

Acerca de este procedimiento

Una **estrechez** es un segmento cicatrizado y estrechado de la uretra que bloquea el flujo de orina. Cuando la estrechez es larga, vuelve a aparecer tras la reparación o la uretra está demasiado dañada para reconstruirla, el cirujano lleva la **parte sana de la uretra** (detrás de la estrechez) a la piel del perineo y la fija abierta para crear una nueva abertura duradera. La orina sale del cuerpo por allí.

Es una solución **fiable y duradera** que evita una reconstrucción más larga o repetida — una buena opción para estrecheces complejas o si prefiere no tener varias operaciones.

Qué saber

El cambio principal es que usted **orinará sentado** por la nueva abertura; la orina ya no sale por la punta del pene. La mayoría de los hombres se adaptan bien y quedan satisfechos. Su **pene queda en su lugar** — la sensación y el orgasmo suelen no cambiar, y la mayoría conserva sus erecciones (algunos notan un cambio). Con el tiempo la abertura puede **estrecharse**; si pasa, un pequeño procedimiento suele abrirla de nuevo.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Uretra

El tubo que lleva la orina fuera del cuerpo.

Estrechez

Segmento cicatrizado y estrechado de la uretra que bloquea el flujo de orina.

Perineo

La zona entre el escroto y el ano, donde se hace la nueva abertura.

Uretrostomía perineal

La operación que lleva la uretra a una nueva abertura permanente en el perineo.

Estoma

La nueva abertura por donde sale la orina.

Estrechamiento del estoma

La nueva abertura se aprieta con el tiempo — suele arreglarse con un pequeño procedimiento.

Sonda

Tubo blando que se deja una o dos semanas mientras cicatriza la abertura.

Anestesia general

Medicina que lo mantiene dormido y sin dolor durante la cirugía.

¿LE DOLERÁ? La cirugía se hace con anestesia general o espinal, así que no siente nada durante ella. Después, espere hinchazón, moretones y dolor en el perineo por 1–2 semanas — los baños de asiento tibios, el hielo y los analgésicos ayudan. Durante la cirugía se coloca una sonda. Muchas personas vuelven a casa el mismo día o tras una noche.

Cómo prepararse (antes de la cirugía)

- Se hace con **anestesia general o espinal** — siga todas las instrucciones (ayuno y qué medicinas suspender, incluidos los anticoagulantes).
- Un **análisis de orina** busca infección (se trata primero); recibirá antibióticos. **No fume** — retrasa la cicatrización.
- Sus piernas estarán apoyadas en estribos durante la cirugía. Prevea una **sonda por 1–2 semanas** y quien lo lleve a casa.

Avisé a su equipo con anticipación si usted:

- Recibió **radiación pélvica** — la nueva abertura tiende más a estrecharse
- Toma un anticoagulante o tiene una infección actual

Qué sucede durante la cirugía

1. Está dormido o adormecido con anestesia, con las piernas apoyadas; se dan antibióticos.
2. Por una incisión en el perineo, el cirujano encuentra la uretra sana detrás de la estrechez y quita o evita la parte cicatrizada.
3. La uretra sana se lleva a la piel y se fija abierta para formar una nueva abertura ancha; se coloca una sonda y se cierra la herida.

Después de la cirugía

- Espere **hinchazón, moretones y dolor** en el perineo por 1–2 semanas. Los baños de asiento tibios, el hielo y los analgésicos ayudan; mantenga la zona limpia.
- La **sonda queda 1–2 semanas**, luego se retira. Después usted orina **sentado** por la nueva abertura.
- **Evite peso, fuerza, bicicleta y sexo** por varias semanas, y no se siente directamente sobre la zona según le indiquen.
- Si su chorro se **debilita con el tiempo**, la abertura puede estrecharse — avise a su equipo; un pequeño procedimiento puede reabrirla.

Llame a su equipo si tiene:

- La sonda se sale o deja de drenar, o **no puede orinar** tras retirarla
- Fiebre o escalofríos, o más enrojecimiento, dolor, hinchazón o secreción en la herida
- Sangrado abundante

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. La uretostomía perineal crea una nueva abertura permanente para la orina en el perineo — cuando la uretra está demasiado estrecha o dañada para repararla. Después usted orina **sentado**.
2. Es duradera y fiable y evita una cirugía más larga o repetida. Su **pene queda en su lugar**; la sensación y el orgasmo suelen no cambiar y la mayoría conserva sus erecciones.
3. Prevea una sonda ~1–2 semanas. La abertura puede estrecharse con el tiempo — avise si su chorro se debilita. Llame si hay fiebre, sangrado abundante o problemas para orinar.