

Terapia de reemplazo de testosterona (Hombres)

WARWIKI

Información para el paciente · Tratamiento de testosterona baja confirmada con síntomas

La terapia de reemplazo de testosterona (TRT) trata a hombres que tienen **tanto** un nivel bajo de testosterona confirmado **como** síntomas de ello — como bajo deseo sexual, fatiga, ánimo bajo, o menos músculo y erecciones. Restaura la testosterona a un rango normal usando un gel, inyección, parche o pellets implantados. **No** es un tratamiento “antienvejecimiento” y no es para niveles normales.

Cómo funciona y para quién es

La testosterona baja (hipogonadismo) se diagnostica con **dos análisis de sangre matutinos** más síntomas — un solo valor bajo no basta. Cuando ambos están presentes, reemplazar la testosterona puede mejorar la energía, la libido, el ánimo y el músculo en semanas a meses.

Las formas

- **Gel o solución** — se aplica a diario (debe evitar el contacto piel con piel con mujeres y niños).
- **Inyecciones** — cada 1–2 semanas, o una forma de acción prolongada cada ~10 semanas.
- **Parches, pellets implantados** (cada 3–6 meses), o un gel nasal.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Testosterona

La hormona masculina principal; afecta la libido, energía, ánimo y músculo.

Hipogonadismo

Testosterona baja confirmada.

Hematocrito

Un recuento sanguíneo que la TRT puede subir — se vigila.

PSA

Análisis de sangre de próstata que se revisa antes y durante el tratamiento.

Fertilidad

La TRT baja la producción de esperma — importante si desea tener hijos.

Transferencia de gel

El gel pasa a otras personas — cubra la zona y lávese las manos.

¿PLANEAR TENER HIJOS? Dígaselo primero a su equipo. La TRT **baja la producción de esperma y puede causar infertilidad** — a veces permanente. Si la fertilidad le importa, hay otros tratamientos que suben la testosterona mientras protegen el esperma. No inicie la TRT sin hablar de esto.

Vigilancia (importante)

La TRT requiere controles y análisis de sangre regulares:

- **Nivel de testosterona** — para confirmar que está en rango.
- **Hematocrito** — la TRT puede espesar la sangre; si sube demasiado, se ajusta o pausa la dosis.
- **PSA / próstata** — se revisa antes y durante; la TRT no se inicia con cáncer de próstata sin tratar.

Cómo usarla de forma segura

- **Gel:** aplíquelo según indicado, déjelo secar, cubra la zona y lávese las manos — evite el contacto con mujeres/niños.
- No cambie su propia dosis; acuda a todas sus citas de laboratorio.
- Avise a su equipo si tiene enfermedad cardíaca o **apnea del sueño** (la TRT puede empeorarla).

Efectos comunes

- Acné, piel grasa, retención de líquidos
- Sensibilidad en las mamas; testículos más pequeños; menos fertilidad
- Más glóbulos rojos (puede requerir vigilancia o una extracción de sangre)

Llame a su equipo o busque atención si tiene:

- **Dolor de pecho, hinchazón/dolor en la pierna, o dificultad para respirar**
- Dolores de cabeza intensos, cambios en la visión, o síntomas de mucho rubor o "sangre espesa"
- Problemas urinarios nuevos o inquietudes de próstata

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. La TRT es para hombres con **testosterona baja confirmada más síntomas** — no para niveles normales ni antienvjecimiento.
2. **Reduce la fertilidad** — avise a su equipo antes de empezar si quiere tener hijos.
3. Necesita **vigilancia continua** (testosterona, recuento sanguíneo, próstata). Con geles, evite la transferencia a otros.