

El relleno uretral es un tratamiento poco invasivo para la **incontinencia urinaria de esfuerzo** — escape al toser, reír o moverse. Se inyecta un material suave alrededor de la uretra para que cierre mejor, y así escape menos orina cuando sube la presión. Es rápido, no requiere incisión y puede ser una alternativa o un paso antes del cabestrillo.

Cómo funciona

El material de relleno se coloca en la pared de la uretra en varios puntos, **engrosándola** para que el conducto cierre más completamente. Con la uretra mejor sellada, los aumentos repentinos de presión abdominal tienen menos probabilidad de empujar la orina hacia afuera.

¿Es adecuado para mí?

- Buena opción si quiere un tratamiento **rápido y de bajo riesgo** sin cirugía
- Útil para quienes no son candidatos al cabestrillo o prefieren evitarlo
- Puede servir de **punto** antes de decidir la cirugía

Suele ser **menos duradero** que un cabestrillo y puede no curar del todo el escape, pero se puede **repetir** si pierde efecto.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Incontinencia de esfuerzo

Escape con presión — toser, reír, levantar peso, ejercicio.

Material de relleno

El material suave que se inyecta para engrosar la pared uretral.

Uretra

El tubo que lleva la orina fuera del cuerpo.

Cistoscopio

La cámara delgada que guía la inyección.

Cabestrillo

Un soporte quirúrgico bajo la uretra — una alternativa más duradera.

¿LE DOLERÁ? Suele ser un **procedimiento en consultorio con anestesia local**, de unos 10–15 minutos. La mayoría siente solo una leve presión y se va a casa el mismo día, retomando pronto su actividad normal. Es común un ardor breve después.

Cómo prepararse

- Un **análisis de orina** para descartar infección antes
- Avise a su equipo sobre **anticoagulantes** y alergias
- Sin preparación mayor — suele poder manejar a casa

Qué sucede

- 1 Se aplica la anestesia local.
- 2 Se pasa un **cistoscopio** delgado para ver la uretra.
- 3 Se inyecta el material de relleno en varios puntos alrededor de la uretra.
- 4 Se retira el cistoscopio; usted vacía la vejiga antes de irse.

Después

- Ardor leve, urgencia o un poco de sangre en la orina por uno o dos días es normal.
- Puede tener **dificultad temporal para vaciar** justo después — suele ser breve.

Llame a su equipo si tiene:

- **No puede orinar** después del procedimiento
- Fiebre o escalofríos (posible infección)
- Sangrado abundante o dolor que empeora

Bueno saber

- El efecto completo se ve en pocas semanas.
- Si el escape vuelve con el tiempo, la inyección se puede **repetir**.
- El cabestrillo sigue siendo una opción luego si quiere algo más duradero.

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. El relleno uretral es una inyección rápida y sin incisión que ayuda a sellar la uretra y reduce el escape por esfuerzo.
2. Es menos duradero que un cabestrillo y puede no curar del todo el escape, pero es de bajo riesgo y repetible.
3. La recuperación es rápida. Llame si no puede orinar o le da fiebre después.