

ضعف الانتصاب (ED) هو صعوبة الحصول على انتصاب كافٍ للجماع المُرضي أو الحفاظ عليه، بشكل متكرر. الحالة شائعة جداً وتزداد مع التقدم في العمر — وهي قابلة للعلاج بدرجة كبيرة. وبما أن الانتصاب يعتمد على تدفق الدم، فقد يكون ضعف الانتصاب إنذاراً مبكراً لأمراض القلب والأوعية الدموية، لذا يستحق التقييم.

الأسباب

يحتاج الانتصاب إلى أوعية دموية سليمة وأعصاب وهرمونات وحالة نفسية متوازنة. وعادةً ما يكون لضعف الانتصاب أكثر من سبب:

- **تدفق الدم (الأكثر شيوعاً)** — يشترك مع أمراض القلب في عوامل الخطر: السكري، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، التدخين، والوزن الزائد.
- **الأعصاب** — بعد جراحة البروستاتا أو الحوض، أو مع السكري أو أمراض العمود الفقري.
- **الهرمونات** — انخفاض التستوستيرون.
- **الأدوية والحالة النفسية** — بعض الأدوية، والتوتر، والقلق، والاكتئاب، أو التوترات العلائقية.

فحص صحة القلب

بما أن الشرايين الصغيرة في القضيب قد تُظهر الخلل مبكراً، فإن ظهور ضعف الانتصاب حديثاً يستدعي قياس ضغط الدم وسكر الدم والكوليسترول — فعلاج هذه الأمور يفيد القلب والانتصاب معاً.

تعلم المصطلحات

ضعف الانتصاب (ED)

صعوبة الحصول على انتصاب كافٍ للجماع أو الحفاظ عليه.

وعائي

يتعلق بتدفق الدم — وهو أكثر أسباب ضعف الانتصاب شيوعاً.

مثبطات PDE5

أقراص الخط الأول لعلاج ضعف الانتصاب (sildenafil، tadalafil، وغيرها).

جهاز الشفط (VED)

مضخة تسحب الدم إلى القضيب لإحداث انتصاب.

الحقن داخل الجسم الكهفي

حقنة ذاتية تُحدث انتصاباً.

دعامة القضيب

جهاز جراحي لحالات ضعف الانتصاب التي لا تستجيب للخيارات الأخرى.

هل يمكن علاجه؟ في الغالب نعم — ضعف الانتصاب من أكثر الحالات قابليةً للعلاج في صحة الرجل، وتتراوح الخيارات بين الأقراص والأجهزة والجراحة. العلاج تدريجي: تبدأ بالخيار الأبسط وترتقي عند الحاجة، وفي كل مرحلة خيار فعال.

كيف تُعالج (خطوة بخطوة)

معلومات مفيدة

- التواصل مع الشريك وعلاج القلق يُسهمان كثيراً في التحسن.
- احذر "المكملات" غير المثبتة المباعة عبر الإنترنت — بعضها يحتوي على أدوية مخفية.

اطلب الرعاية إذا كان لديك:

- ضعف انتصاب مع ألم في الصدر أو ضيق التنفس عند المجهود — اخضع لفحص القلب
- ضعف انتصاب ظهر فجأة بعد إصابة في الحوض أو القضيب
- مع العلاجات: انتصاب مستمر أكثر من 4 ساعات (حالة طارئة)

ثلاثة أمور تذكرها

1. ضعف الانتصاب شائع جداً وقابل للعلاج بدرجة عالية، مع خيار فعال في كل مرحلة من الأقراص إلى الدعامات.
2. قد يكون علامة مبكرة على أمراض القلب والأوعية — التقييم يفيد صحتك العامة، وتغيير نمط الحياة يُحسن الانتصاب.
3. ابدأ الحوار مع فريقك الطبي. اطلب الرعاية عند ضعف الانتصاب المصحوب بالألم الصدر، أو انتصاب يستمر أكثر من 4 ساعات أثناء العلاج.

- 1 **نمط الحياة والصحة العامة** — الرياضة وخفض الوزن والإقلاع عن التدخين والسيطرة على السكري/ضغط الدم تُحسن الانتصاب فعلياً؛ راجع الأدوية المساهمة في المشكلة.
- 2 **الأقراص (مثبطات PDE5)** — خط العلاج الأول المعتاد.
- 3 **جهاز الشفط، أو الحقن، أو التحميلة الإحليلية** — خيارات فعّالة إذا لم تكفِ الأقراص.
- 4 **التستوستيرون** إذا كان منخفضاً؛ الإرشاد النفسي لمعالجة التوتر أو العوامل العلائقية.
- 5 **دعامة القضيب** — خيار جراحي موثوق حين لا تنجح الخيارات الأخرى. لكل خيار نشرة خاصة به.

كيف يُقيّم

- أخذ التاريخ المرضي (بما يشمل عوامل خطر القلب والأوعية) والفحص السريري
- فحوصات دم — سكر الدم، التستوستيرون، الكوليسترول