

الخلل الوظيفي الجنسي لدى المرأة هو مشكلات مستمرة في الرغبة، أو الإثارة، أو الوصول إلى النشوة، أو الألم أثناء الجنس تسبب لك ضيقاً. وهو شائع في كل الأعمار، وعادةً له أسباب متعددة — جسدية وهرمونية ونفسية — وكثيراً ما يمكن علاجه. إنه موضوع طبي يستحق الطرح، وسيساعدك فريقك دون إصدار أحكام.

عن هذه الحالة

تقع المخاوف عادةً في مجال واحد أو أكثر:

- الرغبة — ضعف الاهتمام بالجنس
- الإثارة — صعوبة في بدء الإثارة أو الحفاظ عليها؛ جفاف المهبل
- النشوة — صعوبة في بلوغ الذروة
- الألم — انزعاج أثناء الجنس أو بعده (عسر الجماع)

الأسباب

غالباً تتضافر عدة عوامل:

- انقطاع الطمث / انخفاض الإستروجين — جفاف المهبل وترققه (GSM)
- التوتر قاع الحوض أو ألمه، أو هبوط الأعضاء، أو القلق من سلس البول
- أمراض مزمنة، وعمليات سابقة، وبعض الأدوية (كبعض مضادات الاكتئاب)
- الضغط النفسي، والمزاج، والنوم، وعوامل العلاقة الزوجية

تعلم المصطلحات

Libido

الرغبة الجنسية أو الاهتمام بها.

الإثارة

الاستجابة الجسدية للجسم، بما فيها الترطيب.

Dyspareunia

الألم أثناء النشاط الجنسي أو بعده.

GSM

متلازمة الجهاز البولي التناسلي لانقطاع الطمث — جفاف وترقق بسبب نقص الإستروجين.

الإستروجين المهبل

علاج موضعي بجرعة منخفضة للجفاف والانزعاج.

علاج طبيعى لقاع الحوض

علاج للألم الناجم عن توتر عضلات قاع الحوض.

مزلق / مرطب

منتجات غير هرمونية تخفف الجفاف والاحتكاك.

هل المشكلة "في الذهن فقط"؟ لا. ثمة أسباب جسدية حقيقية وقابلة للعلاج — الجفاف، وتوتر قاع الحوض، وهبوط الأعضاء، وتأثيرات الأدوية — إلى جانب العوامل النفسية والعلائقية التي تؤدي دوراً أيضاً. يشمل التقييم الجيد جميع هذه العوامل، ويجد معظم المرضى تحسناً ملموساً.

كيف تُقَيِّم الحالة

- محادثة سرية ومتأنية حول مخاوفك وتاريخك الصحي
- فحص سريري لتحديد الأسباب الجسدية القابلة للعلاج (الجفاف، توتر قاع الحوض، هبوط الأعضاء)
- مراجعة الأدوية التي تتناولينها وحالتك الصحية العامة

كيف تُعالج

- 1 **تخفيف الجفاف والألم — المزقات والمرطبات، والإستروجين المهبلي للجفاف المرتبط بانقطاع الطمث.**
- 2 **العلاج الطبيعي لقاع الحوض للألم أو توتر العضلات.**
- 3 **معالجة الأسباب المساهمة — هبوط الأعضاء، أو سلس البول، أو الأدوية التي تخفض الرغبة.**
- 4 **الإرشاد النفسي / العلاج الجنسي والاهتمام بالمزاج والضغط والنوم والعلاقة الزوجية.**

خطوات مفيدة

- استخدمي مزلقاً جيداً أثناء العلاقة ومرطباً بانتظام للجفاف.
- التواصل المقترح مع شريكك يقلل الضغط والألم.
- أعطي العلاج وقتاً كافياً؛ الجمع بين أكثر من أسلوب غالباً أجدى.

أخبري فريقك الطبي عن:

- ألم جديد، أو كتلة، أو نزيف غير مألوف
- نزيف بعد الجنس أو بعد انقطاع الطمث
- أي قلق يتعلق بسلامتك في علاقتك

ثلاثة أمور تدكرها

1. المخاوف الجنسية — الرغبة، والإثارة، والنشوة، والألم — شائعة، ولها أسباب حقيقية، وغالباً قابلة للعلاج.
2. كثير من الأسباب جسدية وقابلة للحل (الجفاف، توتر قاع الحوض، الأدوية)؛ والعوامل النفسية والعلائقية مهمة أيضاً.
3. يستحق الأمر الحديث مع فريقك. أبلغني عن أي ألم جديد، أو كتلة، أو نزيف بعد الجنس أو بعد انقطاع الطمث.