

HoLEP جراحة ليزر لتضخم البروستاتا الحميد (BPH) تُزيل الأنسجة الداخلية المسددة عبر منظار — دون شقّ خارجي. ميزتها الكبرى أنها تصلح لأي حجم من البروستاتا، بما فيها الغدد الكبيرة جداً التي كانت تستلزم جراحة مفتوحة، مع نزيف محدود ونتائج طويلة الأمد.

عن هذه العملية

عبر منظار يُدخل في الإحليل (مجرى البول)، يفصل الليزر الهولميوم الجزء الداخلي بأكمله من البروستاتا عن غلافه الخارجي — كإخراج اللبّ من قشرته. تُدفع الأنسجة المحرّرة إلى المثانة ثم تُجَزَّأ وتُستخرج (التفتيت). لأن العملية تُزيل كامل الجزء المسدّد، تكون النتائج **دائمة** وندراً ما يحتاج المريض إلى علاج آخر.

لماذا HoLEP؟

- **تصلح لأي حجم** من البروستاتا، حتى الكبيرة جداً
- **نزيف منخفض** — غالباً مناسبة لمن يتناولون مميّعات الدم
- وقت قصير للقسطرة ونتائج دائمة
- هي تقنية متخصصة — الجراح ذو الخبرة يُحقّق أفضل النتائج.

تعلم المصطلحات

HoLEP

استئصال داخل البروستاتا بالليزر الهولميوم.

BPH

تضخم البروستاتا الحميد (غير السرطاني).

الاستئصال الكامل

إزالة الجزء الداخلي بأكمله من غلافه الخارجي.

الليزر الهولميوم

الليزر المستخدم لفصل الأنسجة وإحكام الأوعية مع نزيف ضئيل.

التفتيت

تجزئة الأنسجة المحرّرة لإمكانية إزالتها.

القذف الرجعي

نشوة جنسية دون إفراز — أثر شائع وغير ضار.

ما الذي يتغير بعد العملية؟ يحصل معظم المرضى على تدفق بول قوي ودائم. كما في عمليات البروستاتا الأخرى، **القذف الرجعي** (النشوة الجافة) شائع. قد يعاني بعض المرضى من إلحاح مؤقت أو تسرب خفيف في الأسابيع الأولى تقريباً دائماً ما يتحسن؛ التأثير الجدي على الانتصاب أو سلس البول الدائم نادر.

كيف تستعد

- تُجرى تحت التخدير العام أو الشوكي — اتبع تعليمات الصيام والأدوية.
- فحص البول للتأكد من خلوه من العدوى قبل الجراحة.
- رتب توصيلة للمنزل؛ القسرة تُزال بسرعة.

ما الذي يحدث بعد العملية

- 1 أنت في سبات أو خدر كامل؛ تُعطى المضادات الحيوية.
 - 2 يُزيل الليزر الجزء الداخلي من البروستاتا، ثم يُفُتَّت ويُستخرج.
 - 3 تُوضع قسرة تُزال عادةً بعد يوم واحد؛ كثيرون يعودون للمنزل في اليوم نفسه أو بعد ليلة واحدة.
- توقع بولاً مصحوباً بدم وبعض الحرق/الإلحاح لأسابيع قليلة؛ أدّ تمارين قاع الحوض إن نُصحت، وتجنّب الجهد والرفع الثقيل.

اتصل بفريقك الطبي أو اطلب الرعاية إذا كان لديك:

- عدم القدرة على التبول بعد إزالة القسرة
- نزيف غزير أو جلطات تسد التدفق
- حمى أو قشعريرة
- تسرب لا يتحسن في الأسابيع الأولى

ثلاثة أمور تذكرها

1. يستخدم HoLEP الليزر لإزالة الجزء الداخلي المسدّد بالكامل عبر منظار — يصلح لأي حجم، نزيف منخفض ونتائج دائمة.
2. توقع تدفقاً قوياً؛ القذف الرجعي شائع، والإلحاح/التسرب المبكر يتحسن في الغالب.
3. وقت القسرة قصير. اتصل عند عدم التبول أو النزيف الغزير أو الحمى.