

ITNS جهاز صغير يُزرع قرب الكاحل يُحفّز العصب الظنبوبي بلطف لتهدئة فرط نشاط المثانة (OAB) — الإلحاح وكثرة التبول وتسرب البول. يشبه PTNS (العلاج بالكاحل في العيادة) لكنه مزروع، مما يتيح العلاج في المنزل دون زيارات أسبوعية.

كيف يعمل

يقع العصب الظنبوبي قرب الجهة الداخلية للكاحل ويتصل بالأعصاب الشوكية التي تتحكم بالمثانة. تحفيزه بلطف يرسل إشارات تُعيد تنظيم نشاط المثانة وتهّدئه — فتقلّ نوبات الإلحاح والتسرّب. يوفّر الجهاز هذه النبضات تلقائياً، فلا حاجة لجلسات متكررة في العيادة. لا أدوية ولا آثار جانبية جهازية.

هل هو مناسب لي؟

- خيار جيد لفرط نشاط المثانة (الإلحاح وكثرة تبول وتسرب إلحاحي)، خاصة إذا لم تُجدِ الأدوية أو سبّبت آثاراً جانبية
- خالٍ من الأدوية — مفيد إذا تعذّر تناول أدوية المثانة
- يختاره كثيرون ممن وجدوا PTNS في العيادة مفيداً لكنهم وجدوا صعوبة في الحضور الأسبوعي
- على خلاف منظّم القلب المثاني، لا تستلزم معظم أجهزة ITNS فترة تجربة مسبقة

تعلم المصطلحات

فرط نشاط المثانة

إلحاح في التبول وكثرته بسبب انقباض المثانة قبل أوانه.

العصب الظنبوبي

عصب قرب الكاحل يرتبط بالتعصيب المثاني.

التعديل العصبي

استخدام نبضات كهربائية لطيفة لتهدئة الأعصاب المفرطة النشاط.

الجهاز المزروع

جهاز صغير يُوضع تحت الجلد في إجراء قصير.

الجهاز القابل للارتداء

سوار كاحل قابل للزرع يُشغّل ويتحكم ببعض الأجهزة.

التخدير الموضعي

دواء تخدير يجعل المنطقة خالية من الألم مع بقائك مستيقظاً.

هل سيؤلم؟ يُزرع الجهاز في إجراء خارجي قصير بالتخدير الموضعي — ستبقى مستيقظاً دون ألم، مع شعور خفيف بالضغط. أما العلاج نفسه فيشبه وخزاً خفيفاً أو انثناءً لطيفاً للأصابع، لا ألماً. يعود معظم المرضى إلى المنزل في اليوم نفسه.

كيف يُجرى

بعد

- قد يكون ثمة ألم خفيف أو تورّم في الكاحل لأيام قليلة؛ أبقِ المنطقة نظيفة وجافة وتجنّب المجهود الشاق ريثما تلتئم.
- يتحسن المفعول تدريجياً خلال أسابيع — كثير من المرضى يحققون تحسناً بنسبة النصف أو أكثر، ويستمر المفعول لسنوات.
- يمكن إيقاف الجهاز أو إزالته عند الحاجة. تختلف قواعد التصوير بالرنين المغناطيسي بحسب النوع — أخبر دائماً فريق التصوير بأن لديك جهازاً مزروعاً.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- احمرار أو تورّم أو إفراز أو حمى (احتمال عدوى)
- ألم جديد أو متفاقم في موضع الكاحل
- فقدان مفاجئ للمفعول أو تحفيز مزعج

نوعا الجهاز

- 1 من خلال شق صغير قرب الكاحل، يُوضع الجهاز بجانب العصب الظنبوبي — عادةً بالتخدير الموضعي في نحو 20-35 دقيقة.
- 2 يُغلق الجرح ويُترك ليلتئم؛ يبدأ العلاج عادةً بعد أسابيع قليلة.
- 3 يضبط فريقك الطبي الإعدادات ويشرح لك كيفية استخدام الجهاز.

- نوع مزروع بالكامل ويعمل ببطاريته الخاصة — لا شيء تلبسه أو تشحنه؛ يُحَقَر تلقائياً وفق جدول محدد.
- النوع الآخر بلا بطارية داخلية؛ تضع سوار كاحل صغيراً يُشغّله ويتيح لك إجراء جلساتك في المنزل.
- سيُخبرك جراحك بنوع الجهاز المناسب لك وطريقة استخدامه.

ثلاثة أمور تذكرها

1. ITNS جهاز صغير قرب الكاحل يُهدئ فرط نشاط المثانة — النسخة المنزلية من PTNS، خالٍ من الأدوية وبلا آثار جانبية جهازية.
2. يُزرع في إجراء خارجي قصير بالتخدير الموضعي، وتستغني معظم الأجهزة عن فترة تجربة مسبقة.
3. يتحسن المفعول تدريجياً ويدوم سنوات؛ تواصل مع فريقك عند ظهور عدوى بموضع الكاحل أو ألم جديد أو فقدان مفاجئ للمفعول.