

دعامة القضيب القابلة للنفخ (IPP) جهاز يُزرع كاملاً تحت الجلد، يتيح لك الحصول على انتصاب قوي متى شئت — للرجال الذين لم يستجيب ضعف انتصابهم للأقراص أو الحقن أو العلاجات الأخرى. تتحكم فيه بمضخة مخفية داخل كيس الصفن. تشرح هذه النشرة آلية عمله وكيفية التحضير وما تتوقعه.

عن هذا الإجراء

حين لا يتحسن ضعف الانتصاب (ED) بالأقراص أو جهاز الشفط أو الحقن، يكون الزرع هو الخطوة الأكثر موثوقية، مع رضا مرتفع جداً. يُزرع جهاز ثلاثي الأجزاء كاملاً تحت الجلد:

- اسطوانتان لينتان داخل القضيب تمتلئان بالسائل لتصلبه
- مضخة في كيس الصفن تضغطها للنفخ وتضغطها لإفراغ الهواء
- خزان للسائل في أسفل البطن

طريقة الاستخدام: اضغط المضخة مرات عدة لملء الاسطوانتين للانتصاب، ثم اضغط صمام التفريغ للعودة إلى الليونة. أنت تختار متى وكم من الوقت.

ما الذي تعرفه

هذا خيار دائم. زرع الدعامة يُغيّر نسيج القضيب، فلا تعود الانتصابات الطبيعية أو علاجات ضعف الانتصاب الأخرى (أقراص، حقن) فعالة — ستصبح الدعامة هي وسيلتك للانتصاب. والمهم أنها لا تؤثر في التبول أو الإحساس أو الشهوة أو القذف. كأي دعامة، تحمل بعض المخاطر — الأبرز العدوى، وقد يحتاج الجهاز إلى استبدال بعد سنوات طويلة.

تعلم المصطلحات

ضعف الانتصاب (ED)

صعوبة الحصول على انتصاب كافٍ للجماع أو الحفاظ عليه.

دعامة القضيب (IPP)

الجهاز المزروع الذي يُحدث انتصاباً عند الاختيار.

الاسطوانتان

الجزءان داخل القضيب اللذان يمتلئان بالسائل ليصلب.

المضخة

الجزء في كيس الصفن يُضغَط للنفخ أو للتفريغ.

الخزان

وعاء السائل المزروع في أسفل البطن.

التفصيل

الزيارة بعد 4-6 أسابيع من الجراحة حيث يُستخدم الجهاز للمرة الأولى وتتعلم تشغيله.

التدوير

نفخ الجهاز وتفريغه يومياً بعد الشفاء — يبقيه يعمل بكفاءة ويساعد في الحفاظ على الطول.

التخدير العام

دواء يُفنيك نائماً وخالياً من الألم أثناء الجراحة.

هل سيؤلم؟ تُجرى الجراحة تحت التخدير العام أو الشوكي فلا تشعر بشيء أثناءها. بعدها توقّع ألماً وتورماً وكدمات في القضيب وكيس الصفن لأسبوعين — يساعد دعم كيس الصفن والتلج ومسكنات الألم. تستغرق الجراحة نحو ساعة ويعود كثيرون إلى المنزل في نفس اليوم. لا تستخدم الجهاز حتى يُقَلَّه جراحك.

كيف تستعدّ (قبل الجراحة)

- تُجرى تحت التخدير العام أو الشوكي — اتبع جميع تعليمات الجراحة (الصيام والأدوية التي ينبغي إيقافها بما فيها مخففات الدم).
- الوقاية من العدوى بالغة الأهمية: تُعالج أي عدوى (بما فيها عدوى البول) أولاً، وستستحم بصابون مطهر وتأخذ مضادات حيوية.
- لا تدخن أو تستخدم السجائر الإلكترونية، وإن كنت مصاباً بالسكري فسيحرص فريقك على ضبط سكر الدم — كلاهما يقلل خطر العدوى.

أخبر فريقك الطبي مسبقاً إذا كان لديك:

- السكري، أو صعوبة في استخدام يديك (تشغل المضخة بنفسك)
- جراحة سابقة في الحوض أو القضيب، أو إشعاع، أو دعامة سابقة

ما الذي يحدث أثناء الجراحة

- 1 أنت نائم أو مخدر من الخصر إلى الأسفل، وتُعطى مضادات حيوية.
- 2 من شقّ صغير واحد (بالقرب من كيس الصفن أو أسفل البطن) يضع الجراح الاسطوانتين في القضيب والمضخة في كيس الصفن والخزان في أسفل البطن — كلها تحت الجلد.
- 3 يُختبر الجهاز ثم يُترك مفرغاً ليلتئم. قد تُوضع قسطرة لفترة قصيرة.

بعد الجراحة

- توقّع تورماً وكدمات في القضيب وكيس الصفن لمدة 1-2 أسبوعين. ارتدّ دعامة الصفن واستخدم الثلج وخذ مسكنات الألم وأبقِ الشق نظيفاً وجافاً.
- لا تستخدم الجهاز أو تمارس الجنس حتى يأذن جراحك — عادةً بعد 4-6 أسابيع. في زيارة التفعيل، يُنفخ الجهاز للمرة الأولى وتتعلم تشغيل المضخة (التفريغ يحتاج أكثر تدريباً).
- بعد ذلك، انفخ الجهاز وفرّغه يومياً ("التدوير") طوال الأشهر الأولى — يبقيه يعمل بسلاسة ويساعد في الحفاظ على الطول.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- حمى أو قشعريرة، أو احمرار أو ألم أو تورم أو إفراز متزايد عند الشق
- عدم القدرة على التبول
- ألم شديد أو متفاقم، أو تغيير لون القضيب إلى الداكن

ثلاثة أمور تذكّرها

1. IPP جهاز مخفي لضعف الانتصاب غير المستجيب للعلاجات الأخرى — اضغط المضخة في كيس الصفن للانتصاب، واضغط صمام التفريغ للعودة إلى الليونة.
2. إنه خيار دائم (لن تعمل الانتصابات الطبيعية والأقراص/الحقن بعده)، لكنه لا يؤثر في التبول أو الإحساس أو الشهوة أو القذف.
3. الوقاية من العدوى أولوية — عالج أي عدوى مسبقاً، ولا تدخن، والتزم بالغسل المطهر والمضادات الحيوية. لا تستخدم الجهاز حتى التفعيل (نحو 4-6 أسابيع) ثم دَوِّره يومياً.