

Dysfonction érectile (DE)

Information pour le patient · Un problème fréquent et traitable — et un signal pour la santé cardiaque

WARWIKI

La dysfonction érectile (DE) est la difficulté à obtenir ou maintenir une érection suffisamment ferme pour des rapports satisfaisants, de façon assez fréquente pour devenir gênante. Elle est très courante et augmente avec l'âge — et elle est très bien traitée. Comme les érections dépendent d'une bonne circulation sanguine, la DE peut aussi être un **signe d'alerte précoce** de maladie cardiovasculaire : il vaut la peine de la faire évaluer.

Causes

Les érections nécessitent des vaisseaux, des nerfs, des hormones et un état psychologique en bonne santé. La DE a souvent plusieurs causes à la fois :

- **Circulation sanguine** (cause la plus fréquente) — partage les facteurs de risque des maladies cardiaques : diabète, hypertension, excès de cholestérol, tabac et surpoids.
- **Nerfs** — après une chirurgie de la prostate ou du bassin, en cas de diabète ou d'atteinte de la colonne vertébrale.
- **Hormones** — faible taux de testostérone.
- **Médicaments et état psychologique** — certains traitements, ainsi que le stress, l'anxiété, la dépression ou des tensions relationnelles.

Un bilan pour la santé cardiaque

Les petites artères du pénis peuvent signaler un problème en premier. Une DE récente est une bonne raison de vérifier la pression artérielle, la glycémie et le cholestérol — les traiter profite à votre cœur **et** à vos érections.

COMPRENDRE LES TERMES

Dysfonction érectile (DE)

Difficulté à obtenir ou maintenir une érection ferme pour des rapports sexuels.

Vasculaire

Lié à la circulation sanguine — cause la plus fréquente de DE.

Inhibiteur de la PDE5

Les comprimés de première intention (sildénafil, tadalafil, etc.).

Pompe à vide (VED)

Dispositif qui aspire le sang dans le pénis pour créer une érection.

Injection intracaverneuse

Auto-injection qui provoque une érection.

Implant pénien

Dispositif chirurgical pour les DE résistant aux autres options.

EST-CE QUE ÇA PEUT SE CORRIGER ? Presque toujours, oui — la DE est l'une des affections les plus traitables en santé masculine, avec des options allant des comprimés aux dispositifs jusqu'à la chirurgie. Le traitement suit une **progression** : on commence par le plus simple et on monte d'un échelon seulement si nécessaire, avec une option efficace à chaque niveau.

Comment on le traite (étape par étape)

- 1 **Mode de vie & santé générale** — l'exercice, la perte de poids, l'arrêt du tabac et le contrôle du diabète/de la tension améliorent réellement les érections ; revoir les médicaments qui peuvent contribuer au problème.
- 2 **Comprimés (inhibiteurs de la PDE5)** — traitement habituel en première intention.
- 3 **Pompe à vide, injections ou suppositoire urétral** — options efficaces si les comprimés ne suffisent pas.
- 4 **Testostérone** si le taux est bas ; **accompagnement psychologique** en cas de stress ou de facteurs relationnels.
- 5 **Implant pénien** — option chirurgicale fiable lorsque les autres ne fonctionnent pas. Chaque option dispose de sa propre fiche d'information.

Comment on l'évalue

- Interrogatoire (antécédents cardiaques et médicaments) et examen clinique
- Analyses sanguines — glycémie, testostérone, cholestérol

À savoir

- La communication avec le partenaire et la prise en charge de l'anxiété ou de l'humeur aident beaucoup.
- Méfiez-vous des « compléments » non éprouvés vendus en ligne — certains contiennent des médicaments dissimulés.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- Une DE avec **douleur thoracique** ou essoufflement à l'effort — consultez pour votre cœur
- Une DE apparue **brutalement après un traumatisme** du bassin ou du pénis
- Sous traitement : une érection durant **plus de 4 heures** (urgence médicale)

TROIS CHOSES À RETENIR

1. La DE est très fréquente et très bien traitée, avec une option efficace à chaque étape, des comprimés aux implants.
2. Elle peut être un signe précoce de maladie cardiovasculaire — un bilan profite à votre santé globale, et les changements de mode de vie améliorent les érections.
3. Parlez-en à votre équipe soignante. Consultez en urgence en cas de DE associée à des douleurs thoraciques, ou d'érection durant plus de 4 heures sous traitement.