

Neurostimulation tibiale implantable (ITNS)

WARWIKI

Information pour le patient · Un petit implant près de la cheville pour la vessie hyperactive

L'ITNS est un petit dispositif placé près de la cheville qui stimule doucement le **nerf tibial** pour calmer une **vessie hyperactive** — urgences mictionnelles, mictions fréquentes et fuites par urgenturie. Il fonctionne comme le PTNS (le traitement de bureau à la cheville), mais, comme le dispositif est **implanté**, vous bénéficiez de la thérapie à **domicile** sans revenir pour des séances hebdomadaires.

Comment ça fonctionne

Le nerf tibial, près de la cheville interne, est relié aux mêmes nerfs spinaux qui contrôlent la vessie. Le stimuler doucement envoie des signaux qui **rééduquent et calment** l'hyperactivité vésicale — réduisant les urgences et les fuites. L'implant délivre ces impulsions pour vous, sans retour aux séances de cabinet. Pas de médicaments, pas d'effets secondaires généraux.

Est-ce fait pour moi ?

- Une bonne option en cas de **vessie hyperactive** (urgences, pollakiurie, fuites par urgenturie), surtout si les médicaments n'ont pas fonctionné ou ont causé des effets indésirables
- Sans médicament — utile si vous ne pouvez pas prendre de traitements vésicaux
- Souvent choisi par les personnes ayant trouvé le **PTNS en cabinet utile**, mais difficile à suivre chaque semaine
- Contrairement à un « stimulateur sacré », la plupart des dispositifs ITNS ne nécessitent **pas de période d'essai** préalable

COMPRENDRE LES TERMES

Vessie hyperactive

Urgences et mictions fréquentes dues à une contraction prématurée de la vessie.

Nerf tibial

Un nerf près de la cheville relié à l'innervation vésicale.

Neuromodulation

Utilisation d'impulsions électriques légères pour calmer des nerfs hyperactifs.

Implant

Petit dispositif placé sous la peau lors d'une courte intervention.

Bracelet de cheville

Un bracelet amovible qui alimente et contrôle certains dispositifs.

Anesthésie locale

Médicament anesthésiant pour que la zone soit indolore pendant que vous restez éveillé.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? Le dispositif est posé lors d'une **courte intervention ambulatoire** sous anesthésie locale — vous êtes éveillé mais ne devriez pas ressentir de douleur, seulement une légère pression. La thérapie elle-même procure une sensation de **picotement** doux ou une légère flexion des orteils, pas de douleur. La plupart des personnes rentrent chez elles le jour même.

Comment ça se déroule

- 1 Par une **petite incision près de la cheville**, le dispositif est placé près du nerf tibial — généralement sous anesthésie locale, en environ **20–35 minutes**.
- 2 Le site est refermé et laissé à cicatriser ; la thérapie commence habituellement **quelques semaines plus tard**.
- 3 Votre équipe programme les réglages et vous explique le fonctionnement du dispositif.

Les deux types de dispositifs

- L'un est **entièrement implanté avec sa propre batterie** — rien à porter ni à recharger ; il stimule automatiquement selon un calendrier défini.
- L'autre **n'a pas de batterie interne** ; vous portez un petit **bracelet de cheville** qui l'alimente et vous permet d'effectuer vos séances à domicile.
- Votre chirurgien vous indiquera quel dispositif vous recevez et comment l'utiliser.

Après

- Légère douleur ou gonflement à la cheville pendant quelques jours ; gardez la zone propre et sèche, et évitez les activités intenses le temps de la cicatrisation.
- Le bénéfice **s'installe sur plusieurs semaines** — beaucoup de personnes obtiennent une amélioration d'au moins 50 %, durable pendant des années.
- Il peut être **éteint ou retiré** si besoin. Les règles IRM varient selon le dispositif — signalez toujours à l'équipe d'imagerie que vous avez un implant.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- Rougeur, gonflement, écoulement ou fièvre (possible infection)
- Douleur nouvelle ou croissante au site de la cheville
- Une **perte soudaine d'efficacité** ou une stimulation inconfortable

TROIS CHOSES À RETENIR

1. L'ITNS est un petit implant près de la cheville qui calme la vessie hyperactive — la version à domicile du PTNS, sans médicaments et sans effets secondaires généraux.
2. Il est posé lors d'une courte intervention ambulatoire, généralement sous anesthésie locale, et la plupart des dispositifs ne nécessitent **pas de période d'essai** préalable.
3. Le bénéfice s'installe sur plusieurs semaines et dure des années ; appelez en cas d'infection au site, de nouvelle douleur ou de perte soudaine d'efficacité.