

Prótesis de pene inflable (IPP)

WARWIKI

Información para el paciente · Qué esperar antes de su cirugía de implante de pene

Una prótesis de pene inflable (IPP) es un dispositivo, colocado completamente debajo de la piel, que le permite tener una erección firme cuando usted lo desee — para hombres cuya disfunción eréctil no ha mejorado con pastillas, inyecciones u otros tratamientos. Usted lo controla con una bomba escondida en el escroto. Esta hoja explica cómo funciona, cómo prepararse y qué esperar.

Acerca de este procedimiento

Cuando la **disfunción eréctil (DE)** no mejora con pastillas, un dispositivo de vacío o inyecciones, un implante es el siguiente paso más confiable, con una satisfacción muy alta. Se coloca un dispositivo de tres partes, todo escondido debajo de la piel:

- Dos **cilindros** blandos dentro del pene que se llenan de líquido para que quede firme
- Una **bomba** en el escroto que usted aprieta para inflar y presiona para desinflar
- Un **depósito** de líquido en la parte baja del vientre

Cómo se usa: apriete la bomba varias veces para llenar los cilindros y lograr una erección; presione la válvula de liberación para que vuelva a quedar blando. Usted decide cuándo y por cuánto tiempo.

Qué debe saber

Esta es una **decisión permanente**. Colocar el implante cambia el tejido eréctil, así que después las erecciones naturales y otros tratamientos para la DE (pastillas, inyecciones) ya no funcionan — el implante se convierte en su forma de tener una erección. Es importante saber que **no cambia su orina, su sensación, su orgasmo ni su eyaculación**. Como cualquier implante, conlleva algún riesgo — principalmente infección, y el dispositivo puede desgastarse con los años y necesitar reemplazo.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Disfunción eréctil (DE)

Dificultad para lograr o mantener una erección lo bastante firme para tener relaciones sexuales.

Prótesis de pene (IPP)

El dispositivo implantado que produce una erección cuando usted lo elige.

Cilindros

Las dos partes colocadas dentro del pene que se llenan de líquido para que quede firme.

Bomba

La parte en el escroto que usted aprieta para inflar y presiona para desinflar.

Depósito

El recipiente de líquido colocado en la parte baja del vientre.

Activación

La visita ~4–6 semanas después de la cirugía donde se usa el dispositivo por primera vez y se le enseña a manejarlo.

Ciclado

Inflar y desinflar a diario después de sanar — ayuda a que siga funcionando bien y a conservar el largo.

Anestesia general

Medicina que lo mantiene dormido y sin dolor durante la cirugía.

¿LE DOLERÁ? La cirugía se hace con anestesia general o espinal, así que no siente nada durante ella. Después, espere dolor, hinchazón y moretones en el pene y el escroto por un par de semanas — un soporte escrotal, hielo y medicina para el dolor ayudan. La cirugía dura aproximadamente una hora, y muchas personas se van a casa el mismo día. No use el dispositivo hasta que su cirujano lo active.

Cómo prepararse (antes de la cirugía)

- Se hace con **anestesia general o espinal** — siga todas las instrucciones de la cirugía (ayuno y qué medicinas suspender, incluidos los anticoagulantes).
- Prevenir la infección es fundamental:** cualquier infección (incluida una infección de orina) se trata primero, y usted se bañará con jabón antiséptico y recibirá antibióticos.
- No fume ni vapee**, y si tiene **diabetes** su equipo querrá que su azúcar en la sangre esté bien controlada — ambas cosas reducen el riesgo de infección.

Avise a su equipo con anticipación si usted:

- Tiene **diabetes**, o dificultad para usar las manos (usted mismo maneja la bomba)
- Ha tenido cirugía previa de la pelvis o del pene, radiación o un implante anterior

Qué sucede durante la cirugía

- 1 Usted está dormido o adormecido de la cintura para abajo con anestesia, y se le dan antibióticos.
- 2 A través de una pequeña incisión (cerca del escroto o en la parte baja del vientre), el cirujano coloca los **cilindros** en el pene, la **bomba** en el escroto y el **depósito** en la parte baja del vientre — todo debajo de la piel.
- 3 Se prueba el dispositivo y luego se deja desinflado para sanar. Puede colocarse una sonda por poco tiempo.

Después de la cirugía

- Espere **hinchazón y moretones** del pene y el escroto 1–2 semanas. Use soporte escrotal y hielo, tome analgésicos y mantenga la incisión limpia y seca.
- No use el dispositivo ni tenga relaciones hasta que su cirujano lo autorice** — unas **4–6 semanas**. En la **visita de activación** se infla por primera vez y le enseñan a usar la bomba (desinflar requiere más práctica).
- Luego, **ínflelo y desínflelo a diario ("ciclado")** los primeros meses — ayuda a que funcione bien y a conservar el largo.

Llame a su equipo si tiene:

- Fiebre o escalofríos, o enrojecimiento, dolor, hinchazón o secreción que aumentan en la incisión
- No puede orinar
- Dolor intenso o que empeora, o el pene se ve oscuro o morado

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. Una IPP es un dispositivo escondido para la DE que no ha respondido a otros tratamientos — apriete la bomba escrotal para lograr una erección, presione la válvula de liberación para quedar blando.
2. Es una **decisión permanente** (las erecciones naturales y las pastillas/inyecciones no funcionarán después), pero **no cambia la orina, la sensación, el orgasmo ni la eyaculación**.
3. Prevenir la infección es lo más importante — trate primero cualquier infección, no fume y use el lavado antiséptico y los antibióticos. No lo use hasta que esté activado (~4–6 semanas), luego cíclelo a diario.