

Cabestrillo uretral masculino

Información para el paciente · Un cabestrillo para tratar el escape de orina tras la cirugía de próstata

WARWIKI

Un cabestrillo masculino es una tira suave de malla que se coloca debajo de la uretra (el tubo por donde sale la orina) para tratar el escape de orina — con mayor frecuencia el escape al toser, levantar peso o hacer actividad que puede aparecer después de la cirugía de próstata. Levanta y sostiene la uretra para que pueda retener mejor la orina. A diferencia del esfínter artificial, no hay nada que usted tenga que accionar. Esta hoja explica cómo funciona, cómo prepararse y qué esperar.

Acerca de este procedimiento

El escape de orina con la actividad, al toser o al levantar peso se llama **incontinencia de esfuerzo**, y a menudo aparece después de la cirugía de próstata. Un cabestrillo lo trata colocando una tira suave de malla debajo de la uretra y levantándola con suavidad hacia su posición normal.

El cabestrillo **sostiene** la uretra en lugar de cerrarla apretándola, de modo que una vez que sane usted **orina con normalidad** — no hay bomba, botón ni dispositivo que accionar.

Qué debe saber

Un cabestrillo funciona mejor para el escape **de leve a moderado** en hombres que aún conservan algo de función del esfínter, lo cual su cirujano comprueba de antemano. Para un escape más abundante, o si usted ha recibido **radiación pélvica**, por lo general la mejor opción es un **esfínter urinario artificial** — su cirujano hablará con usted sobre cuál le conviene. Un cabestrillo puede **reducir** mucho el escape en lugar de detenerlo por completo, y si no es suficiente, todavía se puede colocar un esfínter más adelante.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Incontinencia de esfuerzo

Escape de orina con la actividad, al toser o al levantar peso.

Uretra

El tubo que lleva la orina fuera del cuerpo.

Cabestrillo

Una tira suave de malla que se coloca debajo de la uretra para levantarla y sostenerla.

Prueba de reposicionamiento

Una mirada por dentro con una cámara pequeña para confirmar que levantar la uretra probablemente sea de ayuda.

Retención urinaria

Dificultad temporal para vaciar la vejiga después de la cirugía; puede necesitar una sonda por un tiempo corto.

Esfínter artificial (EUA)

Un dispositivo alternativo, con una bomba, que suele usarse para un escape más abundante.

Anestesia general

Medicina que lo mantiene dormido y sin dolor durante la cirugía.

¿LE DOLERÁ? La cirugía se hace con anestesia general o espinal, así que usted no siente nada durante ella. Después, espere dolor, hinchazón y moretones en la ingle y en la zona entre el escroto y el ano durante un par de semanas — el hielo, un soporte escrotal y los medicamentos para el dolor ayudan. La cirugía dura alrededor de una hora, y muchas personas regresan a casa el mismo día.

Cómo prepararse (antes de la cirugía)

- Se hace con **anestesia general o espinal** — siga todas las instrucciones de la cirugía (ayuno y qué medicamentos suspender, incluidos los anticoagulantes).
- Un **análisis de orina** busca infección (que se trata primero), y una **revisión con cámara (cistoscopia)** confirma que un cabestrillo probablemente sea de ayuda.
- **No fume**, controle su peso y su diabetes, y tome los antibióticos según le indiquen — el cabestrillo es un implante de malla.

Avise a su equipo con anticipación si usted:

- Ha recibido **radiación pélvica** — un cabestrillo a menudo funciona menos bien, y un esfínter puede ser una mejor opción
- Ha tenido una cirugía previa para la incontinencia, o un estrechamiento de la uretra
- Tiene alguna infección, en cualquier parte

Qué sucede durante la cirugía

- 1 Usted está dormido o adormecido de la cintura para abajo con anestesia, y se administran antibióticos.
- 2 A través de pequeñas incisiones en la ingle y entre el escroto y el ano, el cirujano pasa el cabestrillo de malla debajo de la uretra y la levanta hasta su posición.
- 3 El cabestrillo se fija, se cierran las incisiones y por lo general se coloca una sonda durante un tiempo corto.

Después de la cirugía

- Espere **dolor, hinchazón y moretones** en la ingle y el perineo 1–2 semanas. Use hielo, soporte escrotal y analgésicos.
- **Evite peso, esfuerzo, bicicleta y relaciones** varias semanas (~6) — el esfuerzo puede aflojar el cabestrillo antes de que sane.
- Puede tener **dificultad temporal para orinar** y necesitar una sonda un tiempo corto; suele resolverse.
- Use protectores al principio; la mejoría aumenta con las semanas. **No hay nada que accionar** — ya sanado, usted orina con normalidad.

Llame a su equipo si tiene:

- **No puede orinar** en absoluto
- Tiene fiebre o escalofríos, o aumento de enrojecimiento, dolor o secreción en una incisión
- Tiene dolor que empeora en la ingle o el perineo

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. Un cabestrillo masculino es una malla bajo la uretra que la levanta y sostiene, mejorando el control de la orina tras la cirugía de próstata — no hay nada que accionar.
2. Funciona mejor para el escape **de leve a moderado**; para un escape mayor o tras radiación suele ser mejor un esfínter artificial — que aún puede colocarse más adelante.
3. Después, **evite peso, esfuerzo, bicicleta y relaciones** varias semanas para que el cabestrillo sane. Puede costarle orinar al inicio — llame si no puede orinar o hay signos de infección.