

Implante de pene maleable

WARWIKI

Información para el paciente · Un implante flexible (semirrígido) para la disfunción eréctil

Un implante de pene maleable — también llamado implante semirrígido — es un par de varillas firmes y flexibles que se colocan dentro del pene, para hombres cuya disfunción eréctil no ha mejorado con pastillas, inyecciones u otros tratamientos. No hay nada que bombear: usted simplemente dobla el pene hacia arriba para tener relaciones sexuales y hacia abajo para ocultarlo. Esta hoja explica cómo funciona, cómo prepararse y qué esperar.

Acerca de este procedimiento

Cuando la **disfunción eréctil (DE)** no mejora con pastillas, un dispositivo de erección por vacío o inyecciones, un implante es el siguiente paso más confiable. Un implante maleable es el tipo más sencillo — se colocan dos varillas flexibles con recubrimiento suave dentro del pene. Permanece lo suficientemente firme para tener relaciones sexuales en todo momento, y usted lo coloca con la mano:

- Dóblelo **hacia arriba** para tener relaciones sexuales
- Dóblelo **hacia abajo** para ocultarlo bajo la ropa

Como no tiene bomba, depósito ni líquido, es el tipo de implante **más sencillo de usar y el más duradero** — una buena opción si usar una bomba fuera difícil (por ejemplo, con poca fuerza en las manos).

Qué debe saber

Como todos los implantes de pene, esta es una **decisión permanente**: al colocarlo se modifica el tejido eréctil, por lo que después las erecciones naturales y otros tratamientos para la DE (pastillas, inyecciones) ya no funcionarán. **No cambia su forma de orinar, la sensibilidad, el orgasmo ni la eyaculación.** La principal diferencia frente al tipo inflable: el pene permanece firme en todo momento, por lo que puede ser un poco más difícil de ocultar y se siente menos como una erección natural — pero es más sencillo y más duradero.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Disfunción eréctil (DE)

Dificultad para lograr o mantener una erección lo suficientemente firme para tener relaciones sexuales.

Implante de pene

Un dispositivo que se coloca en el pene para permitir erecciones cuando otros tratamientos no han funcionado.

Maleable / semirrígido

Un implante flexible que mantiene el pene firme; usted lo coloca con la mano, sin bomba.

Implante inflable

El otro tipo principal — una bomba lo infla y lo desinfla; más natural, pero con más piezas.

Ocultamiento

Doblar el pene hacia abajo para que el implante no se note bajo la ropa.

Anestesia general

Medicamento que lo mantiene dormido y sin dolor durante la cirugía.

Duradero

De larga duración — al no tener piezas con líquido, hay poco que se desgaste o falle.

¿LE DOLERÁ? La cirugía se realiza con anestesia general o espinal, por lo que no siente nada durante ella. Después, espere dolor, hinchazón y moretones en el pene y el escroto durante un par de semanas — un soporte escrotal, hielo y medicamento para el dolor ayudan. La cirugía es corta (a menudo menos de una hora) y por lo general se hace el mismo día. No use el implante para tener relaciones sexuales hasta que su cirujano lo autorice.

Cómo prepararse (antes de la cirugía)

- Se realiza con **anestesia general o espinal** — siga todas las instrucciones de la cirugía (ayuno y qué medicamentos suspender, incluidos los anticoagulantes).
- Prevenir la infección es fundamental para un implante:** cualquier infección (incluida una infección urinaria) debe tratarse primero; se duchará con jabón antiséptico y recibirá antibióticos.
- No fume ni vapee**, y si tiene **diabetes** su equipo querrá que su nivel de azúcar en sangre esté bien controlado — ambas cosas reducen el riesgo de infección.

Avisé a su equipo con anticipación si usted:

- Tiene **diabetes** o cualquier afección que afecte la cicatrización de las heridas
- Ha tenido cirugía pélvica o de pene previa, radiación o un implante anterior

Qué sucede durante la cirugía

- 1 Usted está dormido o adormecido de la cintura para abajo con anestesia, y se administran antibióticos.
- 2 A través de una pequeña incisión, el cirujano coloca una **varilla flexible en cada una de las dos cámaras** del pene. No hay bomba ni depósito.
- 3 Se cierra la incisión y el pene queda colocado hacia abajo. Se puede colocar una sonda por poco tiempo.

Después de la cirugía

- Espere **hinchazón y moretones** en el pene y el escroto 1–2 semanas. Use soporte escrotal y hielo, tome analgésicos y mantenga la incisión limpia y seca.
- No use el implante para tener relaciones hasta que su cirujano lo autorice** — unas **4–6 semanas**, ya completada la cicatrización.
- Ya cicatrizado, **no hay bomba que aprender** — doble el pene hacia arriba para usarlo y hacia abajo para ocultarlo. Su equipo le mostrará cómo.

Llame a su equipo si tiene:

- Fiebre o escalofríos, o enrojecimiento, dolor, hinchazón o supuración que aumentan en la incisión
- No puede orinar
- Dolor intenso o que empeora, o el pene se ve amoratado u oscuro

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. Un implante maleable son dos varillas flexibles en el pene — dóblelo hacia arriba para tener relaciones y hacia abajo para ocultarlo. Sin bomba; el más sencillo de usar y el más duradero.
2. Es una **decisión permanente** (las erecciones naturales y las pastillas/inyecciones no funcionarán después), pero **no cambia la orina, la sensibilidad, el orgasmo ni la eyaculación**.
3. Prevenir la infección es lo más importante: trate primero cualquier infección, no fume, controle la diabetes y use el lavado antiséptico y los antibióticos. No lo use hasta que su cirujano lo autorice (~4–6 semanas).