

# Cistouretrograma miccional (VCUG)

WARWIKI

Información para el paciente · Qué esperar antes de su radiografía de la vejiga y la uretra

Un cistouretrograma miccional — o “VCUG” — es una prueba de radiografía que toma imágenes de su vejiga y su uretra mientras la vejiga se llena con un líquido especial de contraste y mientras usted orina. Muestra cómo se llena y se vacía la vejiga, y ayuda a su equipo de atención a encontrar problemas como orina que fluye hacia atrás en dirección a los riñones, un estrechamiento o una fuga.

## Acerca de esta prueba

Su vejiga almacena la orina, y la uretra es el tubo que la lleva fuera de su cuerpo. Un VCUG llena la vejiga con un líquido de contraste que se ve blanco en la radiografía y luego graba imágenes mientras usted orina. Como capta la vejiga y la uretra *en acción*, puede mostrar cosas que una imagen fija no puede.

**Su equipo de atención puede pedir un VCUG para:**

- Ver cómo se llena y se vacía la vejiga
- Comprobar si la orina fluye hacia atrás en dirección a los riñones (reflujo)
- Observar el cuello de la vejiga y la uretra durante la micción
- Encontrar un estrechamiento, una fuga o una pequeña bolsa (divertículo)
- Comprobar la cicatrización después de una cirugía de la vejiga, la próstata o la uretra

La prueba examina las vías urinarias inferiores — la vejiga y la uretra. Es una imagen que guía su atención, no un tratamiento.

## ¿Es segura?

Sí. Un VCUG es una prueba común y de bajo riesgo. La cantidad de rayos X que se usa es pequeña, y el líquido de contraste sale de su cuerpo en la orina. El problema más común es una infección urinaria leve a causa de la sonda — por eso se usa una técnica limpia y a veces se administra un antibiótico. Una molestia breve, un ardor leve o un poco de sangre al orinar después suelen ser menores y pasan rápidamente.

## APRENDA LOS TÉRMINOS

### Vejiga

El órgano que almacena la orina hasta que usted está listo para vaciarla.

### Uretra

El tubo que lleva la orina desde la vejiga hacia fuera del cuerpo.

### Sonda

Un tubo delgado y blando que drena o llena la vejiga. El líquido de contraste puede entrar por una que usted ya tenga, o por una que se coloca a través de la uretra para la prueba.

### Sonda suprapúbica (SPT)

Una sonda que drena la vejiga a través de una pequeña abertura en la parte baja del vientre en lugar de la uretra. Si usted tiene una, se puede usar para llenar la vejiga durante la prueba.

### Líquido de contraste

Un líquido que se ve blanco en la radiografía para poder ver la vejiga y la uretra.

### Micción

Orinar — vaciar la vejiga. Las imágenes clave se toman mientras usted orina.

### Reflujo

Cuando la orina fluye hacia atrás desde la vejiga en dirección a los riñones. Un VCUG puede mostrar esto.

### Fluoroscopia

Un tipo de radiografía que muestra imágenes en vivo y en movimiento mientras fluye el líquido de contraste.

### Imagen posmiccional

Una imagen que se toma después de que usted orina, para ver qué tan bien se vació la vejiga.

**¿LE DOLERÁ?** Si usted ya tiene una sonda o una sonda suprapúbica, el líquido de contraste entra por ella — no se coloca nada nuevo. De lo contrario, primero se coloca una sonda delgada (presión breve o escozor). La prueba dura unos 30 minutos.

## Cómo prepararse (antes de su prueba)

Hay muy poco que hacer para prepararse:

- Si usted ya tiene una **sonda urinaria o una sonda suprapúbica**, déjela colocada — por lo general se usará para llenar la vejiga, así que no se necesita un tubo nuevo.
- Puede **comer y beber normalmente** y tomar sus **medicamentos habituales**, a menos que su equipo le indique lo contrario.
- Por lo general puede **conducir usted mismo a casa**, porque no se necesita sedación para la mayoría de los adultos.

### Avisé a su equipo con anticipación si usted:

- Alguna vez ha tenido una reacción al líquido de contraste de rayos X o al yodo
- Toma un anticoagulante
- **Podría estar embarazada** — por lo general se evitan los rayos X durante el embarazo
- Tiene signos de una infección urinaria (ardor, fiebre u orina turbia, con olor fuerte) — una infección activa puede significar que se reprogramme la prueba

Es posible que le pidan una **muestra de orina** para detectar infección, y que le den un **antibiótico** para reducir el riesgo de infección.

## Qué sucede durante la prueba

- 1 Usted se acuesta en una mesa de rayos X.
- 2 **El líquido de contraste se introduce en su vejiga.** Si usted ya tiene una **sonda suprapúbica** o una **sonda uretral**, entra por ella — **no se coloca nada nuevo**. Si no, se pasa una sonda delgada a través de la uretra.
- 3 Su vejiga se llena lentamente por el tubo. Sentirá una sensación de llenado cada vez mayor, como ganas de orinar, y se toman imágenes.
- 4 Con la vejiga llena, le pedirán que **orine mientras la radiografía graba** — la parte más importante. Suele retirarse la sonda primero; una sonda suprapúbica puede taparse brevemente.
- 5 Es posible que se tome una imagen final después de que usted vacíe, para ver qué tan bien se vació la vejiga.

## Después de la prueba

- Por lo general puede irse a casa y volver a sus **actividades normales de inmediato**.
- Puede tener un **ardor leve** al orinar, o un poco de **sangre o un tinte rosado**, durante un día más o menos — beber agua adicional ayuda.
- Si usted tiene una **sonda o una sonda suprapúbica**, su equipo le dirá cómo cuidarla. El líquido de contraste se elimina en la orina en unas pocas horas.

### Llame a su equipo si tiene:

- Fiebre o escalofríos
- Dificultad para orinar, o no puede orinar en absoluto
- Sangrado abundante, o sangrado que no se detiene
- Dolor que empeora en lugar de mejorar

## TRES COSAS PARA RECORDAR

1. Un VCUG es una radiografía segura que llena su vejiga con líquido de contraste y la filma mientras usted orina — muestra cómo funcionan su vejiga y su uretra y encuentra problemas como el reflujo hacia los riñones.
2. Poco que preparar: coma, beba y tome sus medicamentos habituales — pero avise a su equipo sobre cualquier alergia al líquido de contraste, anticoagulantes, una posibilidad de embarazo o signos de una infección urinaria.
3. El contraste entra por un tubo que usted ya tiene o por uno delgado colocado para la prueba; luego usted orina mientras se filma. Un ardor leve o un poco de sangre durante un día es normal — beba agua adicional, y llame si hay fiebre, sangrado abundante o dificultad para orinar.