

5-알파 환원효소 억제제 (전립선 축소 약물)

환자 안내문 · 비대해진 전립선을 서서히 줄이는 약물

WARWIKI

5-알파 환원효소 억제제(5-ARI)는 비대해진 전립선(BPH)을 서서히 줄여 소변 흐름을 개선하고, 장기적으로 요로 폐색과 전립선 수술의 위험을 낮추는 약물입니다. 이 계열에는 **finasteride (Proscar)**와 **dutasteride (Avodart)**가 있습니다. 효과가 서서히 나타나므로 — 수개월간 꾸준히 복용하세요.

작용 원리

이 약은 체내에서 테스토스테론이 **DHT**(전립선 성장을 촉진하는 호르몬)로 전환되는 것을 차단합니다. DHT가 줄면 전립선이 **서서히 줄어들어** 소변 통로가 넓어집니다. 전립선이 줄어드는 데 시간이 걸리므로, 완전한 효과는 **3~6개월**이 지나야 나타납니다 — 빠른 효과를 기대하기 어려우며, 흔히 속효성 알파 차단제와 병용합니다.

기대 효과

- **전립선이 큰** 경우에 가장 효과적이며, 효과는 수개월에 걸쳐 나타납니다.
- **하루 한 번**, 장기 복용합니다.
- 장기적으로 **요폐(소변 막힘)** 위험과 전립선 수술 필요성을 줄입니다.

용어 설명

5-ARI

5-알파 환원효소 억제제 (finasteride, dutasteride).

BPH

전립선비대증(BPH) — 전립선이 비대해진 상태.

DHT

전립선 성장을 촉진하는 호르몬; 이 약이 수치를 낮춥니다.

PSA

전립선 혈액 검사 수치; 이 약이 수치를 약 절반으로 낮춥니다.

요폐

방광을 비울 수 없는 상태 — 장기 복용 시 위험이 줄어듭니다.

Finasteride / dutasteride

이 계열의 두 가지 약물.

PSA 검사 수치에 영향을 줍니다 이 약은 **PSA 혈중 수치를 약 절반으로** 낮춥니다. 이는 건강에 해롭지 않지만, 전립선암 선별 검사 결과를 정확히 판독하려면 담당 의사가 이 사실을 알아야 합니다 — 일반적으로 PSA 결과에 **2를 곱하여** 정상치와 비교합니다. 진료하는 모든 의료진에게 이 약을 복용 중이라고 반드시 알려주세요.

복용 방법

- 매일 **같은 시간에 한 번** 복용하세요; 효과가 나타나기까지 수개월이 걸립니다.
- 초기에 변화가 느껴지지 않더라도 임의로 중단하지 마세요.
- 전립선을 작게 유지하기 위해 장기 복용하는 경우가 많습니다.

주요 안전 정보

- **임산부는 부서진 알약을 만지지 마세요** (남성 태아에 위험); 코팅된 온전한 알약은 만져도 됩니다.
- 복용 중 및 복용 중단 후 일정 기간은 **헌혈하지 마세요**.
- **기분 변화나 우울감**이 나타나면 의료진에게 알려주세요.

흔한 부작용

- 성욕 감소, 발기 어려움, 또는 사정량 감소
- 유방 압통 또는 유방 비대
- 일부 남성에서 성기능 관련 증상이 지속될 수 있음 — 걱정되면 의료진과 상담하세요

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 유방 덩어리, 통증, 또는 유두 분비물
- 새로 생긴 **우울감** 또는 기분 변화
- 소변을 전혀 볼 수 없는 경우 (긴급 진료 필요)

기억할 세 가지

1. 5-ARI는 전립선을 서서히 줄여 소변 흐름을 개선하고 요폐·수술 위험을 낮춥니다 — 3~6개월 간 꾸준히 복용하세요.
2. **PSA 수치를 약 절반으로 낮춥니다** — 전립선암 선별검사 시 담당 의사가 이를 반드시 고려해야 합니다.
3. 임산부는 부서진 알약을 만지지 말고, 복용 중에는 헌혈하지 마세요. 유방 변화나 우울감이 생기면 보고하세요.