

변실금(대변이 새는 것) (Fecal Incontinence)

WARWIKI

환자 안내문 · 가스 또는 대변이 새는 증상 — 흔하고 치료 가능합니다

변실금(대변이 새는 것)이란 가스나 대변을 조절하지 못하는 상태입니다. 화장실에 도달하기 전에 새거나, 본인도 모르는 사이에 새는 경우가 있습니다. 출산 후나 고령에서 많은 분들이 경험하는 흔한 증상이며, 치료가 가능합니다. 부끄러워하지 마시고 의료진에게 말씀해 주시는 것이 회복의 첫걸음입니다.

이 질환에 대하여

대변 조절은 **항문 괄약근**, 골반저, 대변의 굳기, 그리고 이를 조율하는 신경에 달려 있습니다. 이 중 어느 하나에 문제가 생기면 누출이 발생할 수 있으며, 속옷 오염이나 가스 누출부터 고형 대변 손실까지 다양합니다.

원인

- **괄약근 손상** — 출산 시 심한 열상이나 항문 수술 후 흔히 발생합니다
- **묽은 대변 또는 설사** — 고형 대변보다 참기 어렵습니다
- **심한 변비**로 굳은 대변 주위로 묽은 대변이 새는 경우
- **신경 문제**, 직장탈출증, 또는 과민성 장증후군

대부분 여러 요인이 복합적으로 작용하며, 그 중 상당 부분은 개선이 가능합니다.

용어 설명

변실금(Fecal incontinence)

가스나 대변이 의도치 않게 새는 것.

항문 괄약근(Anal sphincter)

배변 전까지 대변을 잡아 두는 고리 모양의 근육.

OASIS

괄약근을 포함하는 심한 출산 열상(3·4도 열상).

식이섬유(Fiber)

묽은 대변을 단단하게 만들어 누출을 줄이는 성분.

바이오피드백(Biofeedback)

골반저 및 괄약근 재훈련 치료법.

천골 신경조절(Sacral neuromodulation)

신경 자극을 통해 조절 능력을 개선하는 치료.

정말 도움이 되는 치료가 있나요? 네 — 대부분의 환자는 대변을 단단하게 하고 근육을 재훈련하는 간단한 방법만으로도 크게 좋아집니다. 필요한 경우 더 적극적인 치료도 효과적입니다. 가장 어려운 것은 말을 꺼내는 일인데, 일단 말씀해 주시면 명확한 치료 방향이 생깁니다.

진단 방법

- 누출 빈도, 양, 유발 요인에 대한 문진
- 항문 괄약근 및 골반저 검사
- 필요 시 괄약근 초음파, 직장항문기능 검사, 또는 내시경

치료 방법 (단계별)

- 1 **대변 조절** —식이섬유를 추가해 대변을 단단하게 하고, 설사나 변비를 치료하며, 규칙적인 배변 습관을 만듭니다.
- 2 **골반저 치료 / 바이오피드백**으로 근육을 강화하고 조율합니다.
- 3 **약물 치료** (지사제 등) — 대변이 묽은 경우에 사용합니다.
- 4 **심화 치료** — 천골 신경조절, 주사형 충전제, 또는 괄약근 복원술.

생활 관리

- 식이섬유와 충분한 수분 섭취로 **잘 형성된 대변**을 목표로 합니다.
- 정해진 시간에 배변하고, 피부를 보호하며 외출 시 용품을 챙깁니다.
- 누출을 악화시키는 음식(카페인, 매운 음식, 인공 감미료)을 기록합니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 대변에 **혈액**이 섞이거나, 검고 끈적한 대변
- 배변 습관의 새로운 변화나 뚜렷한 변화, 또는 원인 불명의 체중 감소
- 발열 또는 심한 복통

기억할 세 가지

1. 변실금은 흔하고 치료 가능한 증상입니다 — 참거나 혼자 감추지 않아도 됩니다.
2. 치료는 대변을 단단하게 하고 근육을 재훈련하는 것부터 시작하며, 필요하면 신경 자극이나 수술로 발전합니다.
3. 의료진에게 말씀해 주세요 — 대변의 혈액, 체중 감소, 배변 습관의 큰 변화는 꼭 알려 주세요.