

후천성 매몰 음경은 성인에서 음경이 아랫배·음낭·허벅지의 피부와 지방 아래에 숨겨지는 상태입니다. 위생 문제, 반복적인 피부 감염, 서서 소변 보기의 어려움, 성생활 장애를 유발할 수 있습니다. 이는 치료 가능한 재건 문제이며 — 수술로 음경을 회복할 수 있습니다.

이 질환에 대하여

“후천성”이란 성인이 된 후 발생했음을 의미합니다(소아에서 흔한 무해한 매몰 음경과 다릅니다). 주요 원인으로는 **체중 증가**와 아랫배 지방 과다, 이전 포경수술 또는 수술로 인한 **흉터**, 만성 피부 부종(**림프부종**), 그리고 **경화성 태선**이라는 반흔성 피부 질환이 있습니다.

이 상태는 악순환을 만드는 경향이 있습니다:

- 접힌 피부가 습기를 머금어 **염증과 감염**이 생깁니다.
- 소변이 피부에 닿아 자극과 흉터가 악화됩니다.
- 시간이 지날수록 위생 관리, 소변, 성생활이 더 어려워집니다.

교정 수술의 효과

수술은 **음경을 해방**시키고, 손상된 피부를 제거하며, 건강한 피부를 재건하는 것을 목표로 합니다. 이를 통해 서서 소변을 보고, 청결을 유지하며, 일상 활동으로 복귀할 수 있습니다 — 교정 수술 후 만족도는 일반적으로 높습니다.

용어 설명

매몰 음경

주변 피부와 지방 아래에 숨겨진 음경.

지방절제술(Panniculectomy)

아랫배의 늘어진 지방·피부 앞치마를 제거하는 수술.

치골 지방절제술(Escutcheonectomy)

음경 위쪽 지방 패드 제거.

피부 이식

음경 몸통을 덮기 위해 건강한 피부를 옮겨 덮는 것.

경화성 태선

매몰 음경을 유발하거나 악화시킬 수 있는 반흔성 피부 질환.

림프부종

음경을 묻어버릴 수 있는 만성 피부 부종.

먼저 체중을 줄여야 하나요? 체중 관련 매몰 음경의 경우, 대개 그렇습니다 — 체중 감량(때로는 비만대사 전문의 의뢰 포함)은 수술 결과와 지속성을 향상시키므로 의료진이 수술 전이나 수술과 병행하여 권고할 수 있습니다. 교정 수술 자체에서 보통 **과도한 지방 패드를 동시에 제거**합니다.

수술 과정

- 1 음경을 가두고 있는 흉터와 조직에서 음경을 **분리·해방**합니다.
- 2 손상되거나 흉터가 있는 피부를 제거하고, 음경 몸통에 **피부 이식**을 시행하는 경우가 많습니다.
- 3 늘어난 지방 패드와 앞치마를 제거(**지방절제술/치골 지방절제술**)하고, 음낭 모양을 교정할 수 있습니다.
- 4 경우에 따라 **단계적으로** 시행되며, 도뇨관 삽입과 배액관 유치가 일반적입니다.

준비 방법

- **체중 조절**(필요 시 비만대사 전문의 의뢰)과 **금연** — 두 가지 모두 회복에 크게 영향을 미칩니다.
- 피부 감염이 있으면 먼저 치료하고, 마취 전 지시 사항을 따르세요.
- 가정에서의 도움과 충분한 휴가를 미리 준비하세요 — 회복에 시간이 필요합니다.

수술 후

- **입원**, 도뇨관, 일정 기간의 배액관 유치가 예상됩니다.
- 피부 이식을 시행한 경우, 지시에 따라 해당 부위에 **얹거나 압박을 가하지 않도록** 보호하세요.
- 상처 관리와 단계적인 활동 재개; 체중 조절이 결과를 유지시켜 줍니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열, 퍼지는 발적, 또는 악취 나는 분비물(감염)
- 이식 피부 또는 상처가 **검게 변하거나**, 벌어지거나, 심한 출혈이 있을 때
- **소변을 볼 수 없거나** 도뇨관 배출이 멈출 때

기억할 세 가지

1. 후천성 매몰 음경은 음경이 피부와 지방 아래 숨겨져 위생 관리, 소변, 감염, 성생활에 문제를 일으키지만 교정이 가능합니다.
2. 교정 수술은 음경을 해방시키고, 손상된 피부를 제거하며(피부 이식 포함), 과도한 지방 패드를 제거합니다. 단계적으로 시행될 수 있습니다.
3. 체중 감량과 금연은 결과를 크게 향상시킵니다. 발열, 이식 피부 변색, 배뇨 장애 시 즉시 연락하세요.