

알파 차단제 (전립선 / 배뇨 개선)

WARWIKI

환자 안내문 · 배출구 근육을 이완시켜 소변 흐름을 개선하는 약

알파 차단제(alpha blockers)는 전립선과 방광경부의 근육을 이완시켜 소변을 더 쉽게 볼 수 있게 해 주는 약입니다 — 전립선비대증(BPH)의 배뇨 증상에 가장 먼저 사용하는 일반적인 치료제입니다. 대표적인 약으로는 **tamsulosin (Flomax)**, **alfuzosin**, **silodosin**, **doxazosin**, **terazosin**이 있습니다. 효과는 빠르게 나타나지만 전립선 크기를 줄이지는 않습니다.

작용 원리

비대해진 전립선은 요도를 압박합니다. 알파 차단제는 **방광 출구 근육을 이완**시켜 소변 줄기를 강하게 하고, 배뇨 지연·힘주기·단속뇨를 줄여 줍니다. **증상**을 완화할 뿐 전립선 크기는 변하지 않으므로, 복용을 멈추면 효과도 사라집니다.

이런 점을 예상하세요

- 보통 **며칠에서 1~2주 이내**에 개선이 느껴집니다.
- 대개 **하루 한 번** 복용합니다. tamsulosin은 매일 **식후 약 30분** 후에 복용합니다.
- doxazosin·terazosin은 어지럼을 줄이기 위해 **취침 전**에 시작하고 용량을 서서히 늘립니다.
- 전립선이 더 큰 경우 전립선을 작게 줄이는 약과 병용할 수 있습니다.

용어 설명

알파 차단제

방광 출구 근육을 이완시키는 약.

BPH

전립선비대증(benign prostatic hyperplasia) — 전립선이 커진 상태.

방광경부

방광과 요도가 만나는 근육 출구.

역행성 사정

정액이 방광으로 역류하는 현상 — 무해하지만 사정액이 줄거나 없을 수 있음.

기립성 저혈압

일어설 때 혈압이 떨어지면서 생기는 어지럼.

백내장 수술 시 홍채이완증후군(IFIS)

알파 차단제로 인해 백내장 수술 중 홍채가 이완되는 현상 — 반드시 안과 의사에게 알려세요.

백내장 수술 예정이신가요? 알파 차단제를 복용 중이거나 과거에 복용한 적이 있다면 반드시 안과 의사에게 알려주세요 — 수술 중 홍채가 “이완”되는 홍채이완증후군(IFIS)이 생길 수 있어 미리 대비해야 합니다. **이미 복용을 중단한 경우에도** 마찬가지입니다.

복용 방법

- 지시에 따라 **매일 같은 시간**에 복용하세요. (tamsulosin은 식후 약 30분 후)
- doxazosin·terazosin은 **첫 복용을 취침 전에** 하고, 일어날 때 천천히 자리에서 일어나세요 — 첫 복용 후 저혈압으로 어지럼이 생길 수 있습니다.
- 한 번 빠뜨렸다고 두 배로 복용하지 마세요.

주요 안전 정보

- 특히 처음에는 **천천히** 일어서서 어지럼이나 실신을 예방하세요.
- PDE5 억제제**나 혈압약과 함께 복용하면 저혈압이 더 심해질 수 있으므로 주의하세요.
- 역행성 사정**(사정액 감소 또는 없음)은 tamsulosin·silodosin 복용 시 흔하지만, 복용을 중단하면 회복됩니다.

흔한 부작용

- 어지럼 또는 두통; 피로감
- 코막힘
- 사정액 감소 또는 “건식” 사정

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 실신 또는 심한 어지럼
- 빠르고 두근거리는 심장 박동 또는 흉통
- 소변이 전혀 나오지 않는 경우 (즉시 진료 필요)

기억할 세 가지

- 알파 차단제는 방광 출구를 빠르게 이완시켜 전립선비대증(BPH)의 배뇨를 개선합니다 — 증상을 완화할 뿐 전립선을 줄이지는 않습니다.
- 초기에는 천천히 일어서세요(어지럼), 사정액 감소는 흔하며 무해합니다.
- 백내장 수술 전에는 복용 여부와 상관없이 반드시 **안과 의사**에게 알파 차단제 복용 이력을 알려주세요.