

베타-3 작용제 (과민성 방광 치료제)

환자 안내문 · 구강 건조 부작용이 적은 최신 방광 치료제

WARWIKI

베타-3 작용제는 과민성 방광(OAB) — 절박뇨, 빈뇨, 절박성 요실금 — 을 치료하는 최신 계열 약입니다. 방광을 이완시켜 저장 용량을 늘려 주며, 구형 항콜린제에 비해 구강 건조, 변비, 인지 부작용이 훨씬 적습니다. 이 계열에는 **mirabegron(미르베트릭)**과 **vibegron(겔테사)** 두 가지가 있습니다.

작용 원리

방광 벽의 **베타-3 수용체**를 활성화하여 소변이 차는 동안 **방광 근육을 이완** 시킵니다. 방광이 안정되면 갑작스러운 절박뇨와 화장실 방문 횟수가 줄어듭니다 — 항콜린제와는 다른 경로로 작용합니다.

기대 효과

- 효과는 **몇 주에 걸쳐** 나타나며 **하루 한 번** 복용합니다.
- 전반적으로 **내약성이 좋고** 구강 건조가 거의 없습니다.
- 항콜린제에서 구강 건조 등 부작용을 경험한 분이나 **고령 환자**에게 적합합니다.
- 증상이 잘 조절되지 않을 때 항콜린제와 병용할 수도 있습니다.

용어 설명

과민성 방광(OAB)

방광이 너무 일찍 수축해 절박뇨와 빈뇨가 생기는 상태.

베타-3 작용제

베타-3 수용체를 통해 방광을 이완시키는 약.

Mirabegron / vibegron

이 계열의 두 가지 약물.

항콜린제

구형 OAB 치료제 계열; 베타-3 작용제는 그 많은 부작용을 피합니다.

혈압

Mirabegron은 혈압을 약간 올릴 수 있어 모니터링합니다.

구형 약보다 이 약을 선택하는 이유는 무엇인가요? 베타-3 작용제는 과민성 방광에 대한 효과는 항콜린제와 비슷하지만 **구강 건조와 변비가 훨씬 적고** 인지 우려가 없어 특히 고령 환자에게 선호됩니다. 주로 확인해야 할 것은 혈압입니다.

복용 방법

- 지시에 따라 **하루 한 번** 복용하고, 효과가 나타나기까지 몇 주를 기다리세요.
- 방광 훈련과 골반저근 운동을 병행하면 효과가 더욱 좋습니다.
- 약 효과와 혈압 확인을 위해 정기 추적 관찰을 빠뜨리지 마세요.

주요 안전 정보

- **Mirabegron은 혈압을 올릴 수 있습니다** — 모니터링하며, 혈압이 매우 높거나 조절되지 않는 경우에는 사용하지 않습니다. (Vibegron은 혈압에 거의 영향을 주지 않습니다.)
- 다른 약을 복용 중이라면 의료진에게 알려주세요 — mirabegron은 일부 약물의 혈중 농도에 영향을 줄 수 있습니다.
- 어떤 OAB 치료를 받든 소변 배출이 어려우면 의료진에게 알려 주세요.

흔한 부작용

- 대체로 경미함 — 두통, 코막힘
- 혈압 상승 (주로 mirabegron)
- 요로감염(UTI) 또는 가벼운 변비

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- **혈압이 매우 높거나** 심한 두통이 생기는 경우
- **소변을 전혀 볼 수 없거나** 방광이 완전히 비워지지 않는 느낌
- **얼굴·입술·혀 부기 또는 호흡 곤란 (드문 알레르기)** — 즉시 응급 처치를 받으세요

기억할 세 가지

1. 베타-3 작용제는 방광을 이완시켜 OAB 증상을 완화하며, 구형 약보다 **구강 건조가 훨씬 적습니다**.
2. 고령 환자나 항콜린제 부작용 경험자에게 적합하며, 효과가 나타날 때까지 몇 주가 필요합니다.
3. Mirabegron은 혈압을 올릴 수 있으니 정기 검진을 받으세요. 소변이 나오지 않거나 혈압이 급등하면 즉시 연락하세요.