

방광 보툴리눔 독소(보톡스) (방광 조절 치료)

WARWIKI

환자 안내문 · 과민성 방광을 완화하는 주사 치료

방광 보툴리눔 독소(보톡스)는 과민성 방광 — 절박뇨, 빈뇨, 절박성 요실금 — 이 생활 습관 개선과 약물 치료로도 충분히 호전되지 않을 때 사용하는 치료법입니다. 소량의 보툴리눔 독소를 가는 내시경으로 방광 근육에 주사하여 근육을 이완시킵니다. 효과는 1-2주에 걸쳐 나타나며, 보통 약 6개월 지속됩니다.

작용 원리

과민성 방광 근육은 때가 되지 않았는데도 수축합니다. 보톡스는 방광 근육을 이완시켜 불필요한 수축을 줄이므로, 절박뇨·빈뇨·절박성 요실금이 완화됩니다. 즉각적인 효과는 없으며, 1-2주에 걸쳐 서서히 호전됩니다.

안전한가요?

네, 충분히 검증된 치료입니다. 가장 중요한 점은, 방광 근육이 이완되면서 소변을 완전히 비우기 어려워질 수 있다는 것입니다. 소수의 환자는 효과가 사라질 때까지 일시적으로 자가도뇨(자가도뇨관 삽입)가 필요할 수 있습니다. 따라서 필요 시 자가도뇨를 배울 의향과 능력이 있어야 합니다. 그 외 부작용으로는 요로감염(UTI)과 일시적 혈뇨가 있습니다.

용어 설명

과민성 방광

방광이 너무 일찍 수축하여 생기는 절박뇨·빈뇨 증상.

보툴리눔 독소(보톡스)

주사로 근육을 이완시키는 약물.

배뇨근(Detrusor)

주사를 놓는 방광 근육.

방광경(Cystoscope)

주사를 전달하는 가는 카메라 내시경.

자가도뇨

가는 도뇨관을 직접 삽입하여 방광을 비우는 방법; 일시적으로 필요할 수 있음.

잔뇨(Post-void residual)

배뇨 후 방광에 남은 소변; 시술 후 확인합니다.

아픈가요? 먼저 방광에 마취약을 넣으므로, 대부분의 환자는 주사 중 가벼운 압박감만 느낍니다. 보통 **국소마취로 외래에서 시행**되며, 약 10-15분이 소요되고 시술 직후 귀가할 수 있습니다.

준비 방법

- 시술 전 **소변 검사**로 감염 여부를 확인합니다.
- 시술 전후에 **항생제**가 처방될 수 있습니다.
- **혈액 희석제** 복용 여부를 의료진에게 알리고, 필요 시 자가도뇨를 배울 준비를 하세요.

진행 과정

- 1 방광에 마취액을 주입합니다.
- 2 가는 **방광경**을 요도를 통해 삽입합니다.
- 3 방광 벽 여러 곳에 보톡스를 주사합니다.
- 4 내시경을 제거합니다 — 전체 과정은 약 10-15분입니다.

후

- 하루이틀간 가벼운 작열감이나 소량의 혈뇨는 정상입니다.
- 1-2주에 걸쳐 호전되며, 효과는 약 6개월 지속되고 **반복 치료**가 가능합니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 소변을 전혀 볼 수 없거나 방광이 다 비워지지 않는 느낌
- 발열 또는 오한 (감염 의심)
- 심한 출혈 또는 혈뇨에 혈전
- 며칠이 지나도 악화되는 작열감

알아 두세요

- 시술 후 **잔뇨량을 확인**합니다.
- 반복 주사는 수개월 간격으로 시행됩니다.

기억할 세 가지

1. 방광 보톡스는 과민성 방광 근육을 이완시켜 절박뇨·빈뇨·절박성 요실금을 완화하며, 1-2주 후 효과가 나타나 약 6개월 지속됩니다.
2. 국소마취 하에 외래에서 빠르게 시행되며, 일부 환자는 일시적으로 자가도뇨가 필요할 수 있습니다.
3. 시술 후 소변을 볼 수 없거나 발열이 생기면 즉시 의료진에게 연락하세요.