

협부 점막(볼 안쪽) 이식편

WARWIKI

환자 안내문 · 요도 또는 요관 재건에 사용되는 볼 안쪽 이식편

재건 수술의 일환으로, 집도의는 볼 안쪽의 촉촉한 점막 조각 — 협부 점막 이식편(buccal mucosa graft) — 을 채취하여 요도(또는 드물게 신장에서 방광으로 이어지는 요관)를 재건합니다. 이 안내문은 볼 안쪽 조직을 사용하는 이유, 수술 과정, 그리고 입의 회복 과정을 설명합니다.

이 이식편에 대하여

볼 안쪽은 요로(泌尿路)와 성질이 비슷한 질기고 촉촉한 조직으로 덮여 있습니다. 집도의는 한쪽 볼(긴 수복이 필요하면 양쪽 볼)에서 얇고 타원형의 조각을 채취하여 좁아진 부위를 넓히거나 재건하는 데 사용합니다. 이식편 채취는 **전신마취 상태에서, 동일한 수술 중에** 이루어집니다.

볼 안쪽 조직을 사용하는 이유

- 털이 없고 요로처럼 촉촉한 환경에 적응되어 있습니다
- 질기고 빨리 아물며 흉터가 적고 감염에 강합니다
- 같은 수술 중에 채취하므로 몸에 별도 절개가 없고 외부에 흉터가 남지 않습니다

안전한가요?

네. 협부 점막 채취는 요도 수술에서 오랫동안 사용되어 온 안전한 방법으로, 환자 만족도가 매우 높습니다. 집도의는 타액이 분비되는 관(이하선 도관)과 입꼬리를 피해 조심스럽게 채취합니다. 대부분의 불편감은 입 안에 국한되며 — 통증, 당김, 감각 저하 — 처음 1~2주 안에 완화됩니다. 양쪽 볼에서 채취하면 불편감이 더 크므로 긴 수복이 필요한 경우에만 사용합니다.

용어 설명

협부 점막(Buccal mucosa)

볼 안쪽을 덮고 있는 촉촉한 조직.

이식편(Graft)

다른 부위를 수복하기 위해 옮기는 자신의 조직 조각.

요도(Urethra)

소변을 몸 밖으로 내보내는 관.

요도성형술(Urethroplasty)

요도를 수복·재건하는 수술; 협부 점막 이식편이 여기에 사용됩니다.

채취 부위(Donor site)

이식편을 채취한 곳 — 여기서는 볼 안쪽.

전신마취(General anesthesia)

수술 중 수면 상태를 유지하고 통증을 없애는 마취.

이하선 도관(Parotid duct)

볼 안쪽에서 타액을 분비하는 작은 개구부; 집도의가 피합니다.

개구 장애(Trismus)

입을 크게 벌리기 어려운 일시적 증상; 부드러운 스트레칭으로 호전됩니다.

아픈가요? 이식편 채취는 전신마취 상태에서 이루어지므로 수술 중에는 아무것도 느끼지 않습니다. 수술 후에는 볼 안쪽이 쓰리고 — 볼을 깨물었을 때나 구내염과 비슷한 느낌 — 당기거나 감각이 저하될 수 있습니다. 불편감은 1~2주 이내에 호전되고 이후로도 계속 회복됩니다. 대부분의 환자는 수술 다음 날 음료를 마실 수 있고, 1주일 이내에 일반 식사가 가능합니다.

준비 방법 (수술 전)

- 이식편 채취는 재건 수술 중 **전신마취** 상태에서 이루어집니다 — 금식 및 복용약 중단 등 일반적인 수술 전 지시사항을 따르세요.
- 사전에 **구강 관리를 철저히** 하세요 — 양치질과 구강 세척을 잘 하고, 의뢰진이 치과 스케일링을 권할 수 있습니다.
- **흡연·전자담배·담배 사용을 삼가세요** — 입과 이식편 회복을 늦춥니다. 수술 전에 금연하면 크게 도움이 됩니다.

다음에 해당하면 **미리** 의료진에게 알려주세요:

- 입·볼·턱 수술을 받은 적이 있거나, 두경부에 방사선 치료를 받은 경우
- 구강 질환이 있거나 입을 크게 벌리기 어려운 경우
- 씹는 담배나 구강(빈랑)을 사용하거나, 지속적인 치과 문제가 있는 경우

수술 과정

- 1 전체 수술 동안 전신마취로 수면 상태를 유지하며, 입은 부드럽게 벌려 고정됩니다.
- 2 집도이가 한쪽 볼(긴 수복이 필요하면 양쪽 볼)에서 얇고 타원형의 점막 조각을 채취하며, 이하선 도관과 입꼬리를 피합니다.
- 3 채취한 이식편을 성형하여 요로의 좁아진 부위를 넓히거나 재건하는 데 사용합니다.
- 4 볼 안쪽은 대개 자연적으로 아물도록 두거나 흡수성 봉합사로 봉합합니다.

수술 후 (입 회복)

- **회복은 두 단계로:** 통증과 당김은 **처음 1~2주 이내에 호전**되지만, 볼은 약 한 달에 걸쳐 계속 회복되며 **감각 저하는 한 달 이상 지속**될 수 있습니다.
- 처음에는 **부드럽고 자극 없는 음식**을 드세요. 맵거나 산성이 강하거나 뜨겁거나 딱딱한 음식, 그리고 술은 피하고, 식후에는 부드럽게 입을 행구세요.
- 매일 입을 **부드럽게 크게 벌리는 스트레칭**을 하여 당김을 완화하세요. **외부에 흉터는 남지 않습니다** — 이식편은 입 안에서 채취합니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열 또는 오한
- 입에서 심하거나 지속적인 출혈
- 입 통증, 부기, 고름이 악화되는 경우(감염)
- 음료를 전혀 마시지 못하거나 입을 전혀 벌릴 수 없는 경우

기억할 세 가지

1. 볼 안쪽의 촉촉한 점막 조각을 채취하여 요도를 재건합니다 — 털이 없고 잘 아물며 외부에 흉터가 남지 않습니다.
2. 요도 수복 수술 중 수면 상태에서 채취합니다. 금식·복용약 지시사항을 따르고, 구강 관리를 잘 하며, 금연하세요.
3. 볼 안쪽이 쓰리고 당기거나 감각이 저하될 수 있습니다 — **1~2주 이내에 호전되지만 완전히 회복되려면 한 달 이상 걸립니다.** 부드러운 음식을 드시고, 부드럽게 행구며, 매일 스트레칭하세요. 발열·심한 출혈·부기가 퍼지면 의료진에게 연락하세요.