

질폐쇄술 (질 폐쇄 수술)

WARWIKI

환자 안내문 · 질을 폐쇄하여 탈출증을 교정하는 간단하고 효과적인 수술

질폐쇄술(colpocleisis)은 골반장기탈출증(pelvic organ prolapse) 치료를 위한 매우 효과적이고 신체 부담이 적은 수술입니다. 질강의 대부분을 폐쇄하여 장기가 내려오지 않도록 영구적으로 지지합니다. 질을 폐쇄하기 때문에, 앞으로 질 성교를 원하지 않는 분에게 적합한 수술입니다. 수술 시간이 짧고 신체 부담이 적으며 성공률이 매우 높아, 고령이거나 다른 건강 문제가 있는 분에게 특히 좋은 선택입니다.

이 수술에 대하여

질폐쇄술은 지지 구조를 재건하는 대신, **질 점막 일부를 제거하고 질벽을 봉합**하여 질강을 짧고 좁게 만들어 장기가 내려오지 않게 합니다. 자궁이 있는 상태에서도, 자궁을 제거한 후에도 시행할 수 있습니다. 광범위한 재건이 필요하지 않아 수술이 빠르고 위험도가 낮으며, 성공률은 **90% 이상**입니다.

중요한 결정

꼭 기억하셔야 할 한 가지: 질폐쇄술 후에는 **질 성교가 더 이상 불가능**하며, 이 변화는 영구적입니다. 이 점을 충분히 이해하고 결정하신 분들의 만족도는 매우 높습니다. 의료진은 이 수술이 적합한지, 자궁 평가 등 추가로 확인해야 할 사항은 없는지 함께 검토해 드립니다.

용어 설명

탈출증

골반 장기가 아래로 처져 불룩하게 튀어나오거나 압박감을 유발하는 상태.

질폐쇄술

장기를 지지하기 위해 질강 대부분을 폐쇄하는 수술.

폐쇄 수술

질을 재건하지 않고 폐쇄하는 방식의 교정 수술.

르포르(LeFort)

자궁이 있는 상태에서 시행하는 질폐쇄술의 한 방법.

슬링

요실금이 있을 경우 동시에 추가할 수 있는 지지 장치.

아픈가요? 수술은 마취(척추마취 또는 전신마취) 하에 진행되므로 수술 중에는 통증을 느끼지 않습니다. 수술 시간도 짧습니다. 수술 후에는 대부분 가벼운 불편감만 느끼며 빠르게 회복됩니다 — 탈출증 수술 중 회복이 가장 수월한 편입니다.

준비 방법

- 질 성교를 하지 않겠다는 **결정이 확실한지** 다시 한번 확인하세요.
- **마취 지침**을 따르세요(금식, 항응고제 복용 중단 지시 준수).
- 수술 전 검사를 받습니다. 요실금이 있으면 **슬링을 함께** 시행할 수 있습니다.
- 귀가 도움 및 집에서 돌봐줄 분을 미리 준비하세요.

진행 과정

- 1 마취 후 항생제를 투여합니다.
- 2 질 점막 일부를 제거하고 질벽을 **봉합**하여 질강을 폐쇄합니다.
- 3 도뇨관을 삽입하고, 경우에 따라 질 패킹을 잠시 사용합니다.

수술 후

- 대개 **당일 퇴원 또는 1박 입원**이며 회복이 빠릅니다.
- 잠시 도뇨관을 사용하며, 약간의 분비물은 정상입니다.
- 수 주간 **무거운 물건 들기와 힘주기를 삼가세요**. 변비를 예방하세요.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열 또는 오한
- 심한 출혈
- 도뇨관 제거 후 **소변을 볼 수 없는** 경우
- 골반 통증이 악화되는 경우

기억할 세 가지

1. 질폐쇄술은 질강을 폐쇄하여 탈출증을 교정합니다 — 빠르고 내구성이 뛰어나며, 간단하고 안전한 수술을 원하는 분에게 이상적입니다.
2. 질 성교가 영구적으로 불가능해집니다 — 이 점이 **확실하게 받아들여지는** 분에게 적합합니다.
3. 회복은 대체로 수월합니다. 힘주기를 삼가고, 발열·심한 출혈·배뇨 곤란 시 의료진에게 연락하세요.