

변비는 대변이 드물게, 딱딱하게, 또는 배출하기 어렵게 나오는 상태입니다. 매우 흔한 증상이며, 변비로 인한 힘주기(복압 증가)는 탈출증, 방광 누수, 골반 통증을 악화시키므로 골반 건강에 중요한 영향을 미칩니다. 대부분의 변비는 간단하고 검증된 방법으로 개선됩니다.

이 질환에 대하여

건강한 배변은 힘을 주지 않고도 이루어져야 합니다. 변비의 증상으로는 주 3회 미만의 배변, 딱딱하거나 덩어리진 대변, 힘주기, **잔변감**, 또는 대변을 배출하기 위해 질이나 직장 주변을 눌러야 하는 것("지지 배변") 등이 있습니다.

원인

- **식이섬유와 수분 부족**, 그리고 운동 부족
- **변의를 무시하는 습관**
- **약물** — 마약성 진통제, 철분제, 일부 다른 약물
- **골반저 문제** — 근육이 이완되지 않아 대변 배출이 어려운 경우("출구형" 변비)
- **결장의 느린 운동**

"출구형" 변비는 완하제만으로는 부족하며, **골반저 치료**가 필요합니다.

용어 설명

변비

대변이 드물게, 딱딱하게, 또는 배출하기 어려운 상태.

식이섬유

대변을 부드럽고 부피감 있게 만드는 식물성 성분.

삼투성 완하제

장 내로 수분을 끌어들여 대변을 부드럽게 하는 약제 (예: PEG).

출구형 변비

골반 근육이 이완되지 않아 대변 배출이 어려운 변비.

바이오피드백

배변 시 근육을 이완하도록 재훈련하는 치료.

지지 배변

대변 배출을 돕기 위해 질이나 직장 근처를 누르는 행위.

비뇨기과 의사가 변비를 신경 쓰는 이유는? 딱딱한 대변을 배출하기 위해 힘을 주면 방광과 골반 장기를 지지하는 구조에 압력이 가해집니다. 따라서 변비는 탈출증과 요실금을 악화시키며, 직장이 팽 차면 방광을 압박할 수 있습니다. 변비를 개선하면 방광 증상도 함께 좋아지는 경우가 많습니다.

치료 방법 (단계별)

- 1 **식이섬유, 수분, 활동** — 식이섬유를 서서히 늘리고(음식 또는 보충제), 충분한 물을 함께 마십니다.
- 2 **배변 습관** — 변의가 느껴지면 즉시 화장실에 가고, **발판**을 사용해 무릎을 높이고(꼬그린 자세), **힘을 주지 마십시오**.
- 3 **부드러운 완하제** — 삼투성 완하제(예: PEG)는 필요한 경우 정기적으로 안전하게 사용할 수 있습니다.
- 4 출구형 변비에는 **골반저 치료 / 바이오피드백**을 받고, 변비를 유발할 수 있는 약물을 의료진과 검토하세요.

건강한 배변 습관

- 식사 후 등 **매일 같은 시간**에 화장실을 이용하세요.
- 여유롭게 시간을 갖고, 절대 힘을 주지 마세요.
- 활동적으로 생활하세요 — 매일 걷기만 해도 장 운동에 도움이 됩니다.

알아두면 좋은 것

- 식이섬유는 **천천히** 늘려야 복부 팽만을 피할 수 있으며, 충분한 수분 섭취가 필요합니다.
- 자극성 완하제는 가끔 사용할 수 있지만, 매일 사용하기 전에 의료진에게 문의하세요.
- 힘주기가 주된 문제라면 근육 조절 문제일 수 있으며, 완하제보다 치료가 더 효과적입니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 대변에 **혈액**이 섞이거나, 원인 불명의 체중 감소
- 특히 연령이 높은 경우, 개선되지 않는 새로운 변비
- 심한 복통, 구토, 또는 **가스나 대변이 전혀 나오지 않음**(장 폐색 가능성)

기억할 세 가지

1. 변비는 흔하며 골반 건강에 중요합니다 — 힘주기는 탈출증과 요실금을 악화시킵니다.
2. 식이섬유, 수분, 운동, 올바른 배변 습관(발판 사용, 힘주기 금지), 필요 시 부드러운 완하제로 개선하세요.
3. 힘주기가 계속되면 골반저 치료를 문의하세요. 혈변, 체중 감소, 갑작스러운 심한 변화는 즉시 알려주세요.