

방광조영술(cystogram)은 방광을 촬영하는 간단한 X-선 검사입니다. 도뇨관을 통해 특수 조영제(contrast dye)를 방광에 채운 뒤 X-선으로 촬영합니다. 수술 부위가 잘 아물었는지, 누출(leak)이 있는지, 비정상적인 연결(누공)이 있는지, 또는 소변이 신장 쪽으로 역류하는지를 확인하는 데 사용합니다.

이 검사에 대하여

방광은 일반 X-선으로는 잘 보이지 않습니다. 방광조영술은 X-선에서 흰색으로 나타나는 **조영제**를 방광에 채워 모양과 기능을 확인합니다. 의사가 이 검사를 지시하는 경우는 다음과 같습니다.

- 수술 부위가 잘 아물었는지 확인 — 도뇨관 제거 전에 흔히 시행됩니다
- 손상이나 수술 후 누출 여부 확인
- 방광과 다른 장기 사이의 비정상적 연결인 **누공(fistula)** 발견
- 소변이 방광에서 신장 방향으로 역류하는 **역류증** 확인

조영제를 주입하는 방법은 상황에 따라 다릅니다.

- 현재 **도뇨관이 없는 경우**, 검사를 위해 작은 도뇨관을 삽입합니다.
- 이미 **요도 도뇨관**이나 **치골상부 도뇨관(suprapubic tube)**이 있는 경우, 새 도뇨관 없이 그 관을 통해 조영제를 주입합니다.

안전한가요?

네, 방광조영술은 안전하고 흔히 시행되는 검사입니다. X-선 노출량은 적으며, 수용성 조영제는 소변으로 자연스럽게 배출됩니다. 대부분의 환자는 충만감이나 가벼운 압박감만 느낍니다. 드물게 요로감염, 일시적인 따끔거림, 또는 경련이 있을 수 있으나 대개 가볍고 금방 사라집니다.

용어 설명

방광조영술

조영제로 방광을 채운 상태에서 촬영하는 X-선 검사.

방광

소변을 저장하다가 배출하는 근육 주머니.

조영제

X-선에서 흰색으로 나타나 방광을 선명하게 보이게 하는 액체.

도뇨관

조영제를 방광에 주입하는 데 사용하는 가늘고 부드러운 관.

치골상부 도뇨관

하복부를 통해 방광을 배액하는 도뇨관; 이 관으로 조영제를 주입할 수 있습니다.

누공

방광과 다른 장기 사이의 비정상적 연결로, 방광조영술로 발견할 수 있습니다.

역류

소변이 방광에서 신장 쪽으로 역류하는 현상.

배뇨 중 촬영

필요한 경우 소변을 보는 동안 추가로 찍는 X-선 사진.

아픈가요? 대부분의 환자는 방광이 차는 동안 충만감이나 가벼운 압박감만 느끼며, 심한 통증은 없습니다. 검사를 위해 도뇨관을 삽입할 때 잠깐 따끔할 수 있습니다. 언제든지 의료진에게 말씀하시면 속도를 늦추거나 중단할 수 있습니다. 검사는 보통 15-30분 정도 걸립니다.

준비 방법 (검사 전)

특별한 준비는 거의 필요하지 않습니다. 대부분의 경우:

- 다른 지시가 없는 한 **평소대로 드시고 마시며 약도 그대로 복용**하셔도 됩니다.
- 도뇨관이나 치골상부 도뇨관이 있는 경우 **그대로 두세요** — 조영제를 그 관으로 주입합니다.
- 진정제를 사용하지 않으므로 보통 **직접 운전하여 귀가**하실 수 있습니다.

검사 전에 미리 의료진에게 알려주세요:

- X-선 조영제나 요오드에 이전에 반응이 있었던 경우
- 혈액 희석제(항응고제)를 복용 중인 경우
- 요로감염 증상이 있는 경우 (따끔거림, 발열, 탁하거나 냄새 나는 소변) — 활동성 감염이 있으면 검사가 연기될 수 있습니다

진행 과정

- 1 X-선 검사대에 눕습니다. 도뇨관이 없는 경우 작은 도뇨관을 조심스럽게 삽입하고, 이미 있는 경우 연결합니다.
- 2 X-선 사진을 찍으면서 조영제를 방광에 천천히 주입합니다. 움직이지 않고 평소대로 호흡하도록 안내받을 수 있습니다.
- 3 검사에 포함된 경우, 방광이 비워지는 모습을 촬영하기 위해 **소변을 보도록** 요청받을 수 있습니다.
- 4 사진 확인 후 도뇨관을 제거하거나, 기존 관은 그대로 유지합니다.

후

- 대부분 바로 귀가하여 **일상생활을 재개**할 수 있습니다.
- 하루 정도 **소변 볼 때 가벼운 따끔거림**이 있을 수 있습니다. 물을 충분히 마시면 도움이 됩니다.
- 소변에 **분홍빛**이 잠깐 보일 수 있습니다. 이는 흔한 현상으로 보통 하루 이내에 사라집니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열 또는 오한
- 소변이 잘 나오지 않거나 전혀 나오지 않는 경우
- 심한 출혈 또는 소변에 혈액 덩어리가 보이는 경우
- 통증이나 복부 경련이 나아지지 않고 악화되는 경우

기억할 세 가지

1. 방광조영술은 조영제로 방광을 채워 수술 부위 치유 여부, 누출, 누공, 역류를 확인하는 빠르고 안전한 X-선 검사입니다.
2. 특별한 준비는 거의 필요 없습니다. 도뇨관이나 치골상부 도뇨관은 그대로 두고, 조영제 알레르기·항응고제 복용·요로감염 증상이 있으면 미리 알려주세요.
3. 대부분 충만감만 느끼고 바로 귀가합니다. 하루 정도 가벼운 따끔거림이나 분홍빛 소변은 정상입니다 — 물을 충분히 드시고, 발열·심한 출혈·배뇨 곤란 시 의료진에게 연락하세요.