

방광경 검사

환자 안내문 · 방광과 요도 내부를 살펴보는 검사

WARWIKI

방광경 검사(cystoscopy)는 카메라와 조명이 달린 가느다란 내시경(방광경)을 자연 배뇨구를 통해 부드럽게 삽입하여 요도와 방광 내부를 직접 확인하는 검사입니다. 혈뇨, 반복 감염, 요도 협착, 기타 방광 이상의 원인을 파악하거나 치료 후 경과를 확인하는 데 사용됩니다.

이 검사에 대하여

방광경(cystoscope)은 끝에 카메라가 달린 가느다란 관입니다. 두 종류가 있습니다.

- **연성(굴곡형) 방광경**은 마취 젤을 사용하여 깨어 있는 상태에서 외래에서 시행합니다.
- **경성(직선형) 방광경**은 수술실에서 수면(마취) 상태로 시행하며, 같은 자리에서 치료도 함께 할 수 있습니다.

멸균 세척액을 주입하여 방광 벽을 선명하게 볼 수 있도록 벌려 줍니다. 집도 의가 방광경 검사를 처방하는 경우는 다음과 같습니다.

- **혈뇨**나 반복 감염의 원인 파악
- **협착(stricture)**, 결석, 종양 확인
- 수술 후 치유 상태 확인 또는 소량 조직 채취(생검)
- **스텐트** 또는 봉합사 삽입·확인·제거

안전한가요?

네. 방광경 검사는 비뇨기과에서 가장 흔한 검사 중 하나로 위험도가 낮습니다. 대부분의 경우 일시적인 불편감만 있습니다. 요로감염(UTI), 소량의 혈뇨, 일시적인 배뇨 시 통증이나 불편감 등의 부작용은 드물고 대개 가볍게 지나갑니다.

용어 설명

방광경(Cystoscope)

방광 내부를 보기 위해 사용하는 카메라와 조명이 달린 가느다란 내시경.

방광(Bladder)

소변을 저장했다가 배뇨 시 배출하는 근육 주머니.

요도(Urethra)

방광에서 소변을 몸 밖으로 내보내는 관.

연성 vs. 경성

연성(굴곡형): 외래에서 깨어 있는 상태로 시행. 경성(직선형): 수술실에서 마취 후 시행.

마취 젤(Numbing gel)

방광경이 편하게 들어갈 수 있도록 요도에 바르는 국소마취 젤.

생검(Biopsy)

현미경으로 검사하기 위해 소량의 조직을 채취하는 것.

스텐트(Stent)

관 내부가 열려 있도록 유지하는 부드러운 관; 검사 중 삽입하거나 제거할 수 있습니다.

잔뇨(Post-void residual)

소변을 본 후 방광에 남아 있는 소변의 양.

아픈가요? 연성 방광경의 경우, 삽입 시 짧은 압박감이나 따끔함이 있을 수 있으나 마취 젤이 불편함을 줄여 주며 외래 검사는 보통 몇 분 안에 끝납니다. 경성 방광경은 마취 상태에서 시행하므로 검사 중 아무것도 느끼지 않습니다. 불편한 점이 있으면 언제든지 의료진에게 말씀하세요.

준비 방법 (검사 전)

- **외래(연성) 방광경 검사**는 대개 **평소대로 드시고, 약도 그대로 복용**하시면 되며, 직접 운전하여 귀가하실 수 있습니다.
- **마취가 필요한 방광경 검사**는 수술 안내에 따라 금식하고, 복용을 중단할 약을 확인하며, 귀가를 도와 줄 분을 미리 준비하세요.
- 감염 여부 확인을 위해 **소변 검사**를 요청받을 수 있으며, **항생제**가 처방될 수 있습니다.

다음에 해당하면 **미리 의료진에게 알려 주세요.**

- **혈액 희석제(항응고제)**를 복용 중인 경우
- **요로감염 증상**(배뇨 시 통증, 발열, 탁하거나 냄새가 심한 소변)이 있는 경우 — 활동성 감염이 있으면 검사가 연기될 수 있습니다.
- 알레르기가 있거나 이전에 방광경 삽입이 어려웠던 적이 있는 경우

진행 과정

1. 편하게 누운 자세로 위치를 잡아 드립니다. 요도 입구를 소독하고 마취 젤을 바릅니다.
2. 방광경을 요도를 통해 방광 안으로 부드럽게 삽입합니다.
3. 멸균 세척액을 주입하여 방광을 확장한 뒤, 집도위가 방광 내벽을 전체적으로 확인합니다.
4. 방광경을 제거합니다. 치료·생검·스텐트 교체가 예정된 경우 제거 전에 시행합니다.

후

- 외래 검사 후에는 대개 **즉시 일상 활동**이 가능합니다. 마취 후에는 충분히 쉬고 귀가를 도와 줄 분이 필요합니다.
- 하루 정도 **배뇨 시 가벼운 따끔함**이 있을 수 있습니다. 물을 충분히 마시면 완화됩니다.
- 소변에 **분홍빛**이 잠깐 보일 수 있습니다. 흔한 현상이며 보통 하루 안에 사라집니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열 또는 오한
- 소변이 잘 나오지 않거나 전혀 나오지 않는 경우
- 심한 출혈 또는 혈뇨에 혈전이 섞인 경우
- 통증이 나아지지 않고 심해지는 경우

기억할 세 가지

1. 방광경 검사는 가느다란 카메라로 방광과 요도 내부를 빠르고 안전하게 확인하는 검사로, 문제 원인 파악이나 치료 후 경과 확인에 사용됩니다.
2. 외래 검사는 특별한 준비가 거의 필요 없습니다. 마취가 필요한 경우 금식 안내를 따르고, 귀가를 도와 줄 분을 준비하세요. 항응고제 복용 중이거나 감염 증상이 있으면 미리 알려 주세요.
3. 하루 정도 가벼운 따끔함이나 분홍빛 소변은 정상입니다. 물을 충분히 마시고, 발열·심한 출혈·배뇨 困難(곤란)이 있으면 의료진에게 연락하세요.