

발기부전 (ED)

WARWIKI

환자 안내문 · 흔하고 치료 가능한 문제 — 심장 건강의 신호이기도 합니다

발기부전(ED)은 만족스러운 성생활에 충분한 발기를 얻거나 유지하는 데 어려움을 겪는 상태입니다. 매우 흔하며 나이가 들수록 증가하지만, 치료 효과가 높습니다. 발기는 원활한 혈류에 의존하므로, ED는 심혈관 질환의 초기 경고 신호가 될 수 있어 평가가 중요합니다.

원인

발기는 혈관, 신경, 호르몬, 심리적 요소가 함께 작용해야 합니다. ED는 보통 여러 원인이 복합적으로 작용합니다.

- **혈류 문제** (가장 흔함) — 당뇨병, 고혈압, 고콜레스테롤, 흡연, 과체중 등 심장 질환과 위험 인자를 공유합니다.
- **신경 손상** — 전립선·골반 수술 후, 당뇨병, 척추 질환 등에서 발생합니다.
- **호르몬 이상** — 낮은 남성호르몬(테스토스테론) 수치.
- **약물 및 심리적 요인** — 일부 약물과 스트레스, 불안, 우울, 관계 갈등.

심장 건강 확인

음경의 작은 동맥이 먼저 이상을 나타낼 수 있어, 새로운 ED가 생기면 혈압·혈당·콜레스테롤을 확인하는 것이 좋습니다. 이를 치료하면 심장과 발기 모두에 도움이 됩니다.

용어 설명

발기부전(ED)

성생활에 충분한 발기를 얻거나 유지하기 어려운 상태.

혈관성(Vascular)

혈류와 관련된 것 — ED의 가장 흔한 원인.

PDE5 억제제

1차 ED 치료제(sildenafil, tadalafil 등).

진공 발기 기구(VED)

음경에 혈액을 유입시켜 발기를 유도하는 펌프 기구.

음경 해면체 주사

발기를 유발하는 자가 주사 요법.

음경 보형물

다른 치료로 효과가 없을 때 삽입하는 수술적 장치.

치료가 가능한가요? 거의 항상 가능합니다 — ED는 남성 건강 문제 중 치료 성공률이 매우 높으며, 약물부터 기구, 수술까지 다양한 선택지가 있습니다. 치료는 **단계적**으로 진행합니다. 간단한 방법부터 시작하여 필요할 때만 다음 단계로 넘어가며, 모든 단계에서 효과적인 방법이 있습니다.

치료 방법 (단계별)

- 1 **생활 습관 교정** — 운동, 체중 감량, 금연, 당뇨병·고혈압 조절은 발기 기능을 실질적으로 개선합니다. 원인이 될 수 있는 약물도 검토합니다.
- 2 **경구 약물 (PDE5 억제제)** — 일반적인 1차 치료법.
- 3 **진공 발기 기구, 주사 요법, 요도 좌약** — 약물이 충분하지 않을 때 효과적인 대안.
- 4 **테스토스테론 치료** (수치가 낮은 경우), **상담 치료** (스트레스·관계 문제).
- 5 **음경 보형물** — 다른 방법이 효과가 없을 때 신뢰할 수 있는 수술적 선택지. 각 옵션에 대한 별도 안내문이 있습니다.

진단 방법

- 병력 청취(심혈관 위험 인자 및 복용 약물 포함)와 신체검사
- 혈액검사 — 혈당, 남성호르몬, 콜레스테롤

알아두세요

- 파트너와의 대화와 불안·우울 치료가 큰 도움이 됩니다.
- 온라인에서 판매하는 검증되지 않은 “건강보조제”를 주의하세요 — 일부는 성분 미표시 약물을 함유합니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- ED와 함께 **흉통**이나 운동 시 호흡곤란 — 심장 검사 필요
- 골반이나 음경 **부상 후 갑자기** 발생한 ED
- 치료 중 **4시간 이상** 지속되는 발기 (응급 상황)

기억할 세 가지

1. ED는 매우 흔하고 치료 성공률이 높습니다. 약물부터 보형물까지 모든 단계에서 효과적인 방법이 있습니다.
2. ED는 심혈관 질환의 초기 신호일 수 있습니다. 검사는 전반적인 건강에 도움이 되며, 생활 습관 교정은 발기 기능을 개선합니다.
3. 의료진과 편하게 상담하세요. 흉통이 동반된 ED나 치료 중 4시간 이상의 발기는 즉시 진료를 받으세요.