

남성 요도 슬링은 요도(소변이 흐르는 관) 아래에 부드러운 메시(mesh) 띠를 삽입하여 요실금을 치료하는 수술입니다. 주로 전립선 절제 후 기침·운동·무거운 물건을 들 때 생기는 복압성 요실금에 사용합니다. 슬링이 요도를 들어 올려 소변을 더 잘 참을 수 있게 해줍니다. 인공 괄약근(AUS)과 달리 별도로 조작할 장치가 없습니다. 이 안내문은 수술 원리, 준비 방법, 회복 과정을 설명합니다.

이 수술에 대하여

활동·기침·무거운 물건을 들 때 소변이 새는 것을 **복압성 요실금**이라 하며, 전립선 수술 후 흔히 발생합니다. 슬링은 요도 아래에 부드러운 메시 띠를 삽입하여 요도를 정상 위치로 살짝 들어 올려 치료합니다.

슬링은 요도를 **지지할 뿐** 조이지 않으므로, 회복 후에는 **정상적으로 소변을 볼 수 있습니다**. 펌프나 버튼 등 조작할 장치가 없습니다.

알아두어야 할 사항

슬링은 아직 괄약근 기능이 남아 있는 남성의 **경증~중등도** 요실금에 가장 효과적입니다. 집도의가 사전에 괄약근 기능을 확인합니다. **중증 요실금**이거나 **골반 방사선 치료**를 받은 경우에는 **인공 요도괄약근(AUS)**이 더 적합할 수 있으므로, 집도의와 충분히 상담하십시오. 슬링으로 요실금이 완전히 없어지지 않고 크게 줄어드는 경우도 있으며, 효과가 충분하지 않으면 나중에 AUS를 시행할 수 있습니다.

용어 설명

복압성 요실금

활동·기침·무거운 물건을 들 때 소변이 새는 증상.

요도

소변이 몸 밖으로 나오는 관.

슬링

요도 아래에 삽입하여 요도를 들어 올리는 부드러운 메시 띠.

위치 확인 검사

소형 카메라로 요도 내부를 보며 슬링이 도움이 될지 확인하는 검사.

요폐(소변 막힘)

수술 후 일시적으로 방광을 비우기 어려운 상태. 짧은 기간 도뇨관이 필요할 수 있음.

인공 요도괄약근(AUS)

펌프가 달린 대안 장치로, 주로 중증 요실금에 사용.

전신마취

수술 중 완전히 잠든 상태로 통증을 느끼지 않게 하는 마취.

아픈가요? 수술은 전신마취 또는 척추마취로 진행되므로 수술 중에는 통증이 없습니다. 수술 후 1~2주간 서혜부(사타구니)와 회음부(음낭과 항문 사이)에 통증·부기·멍이 생길 수 있으며, 얼음찜질·음낭 지지대·진통제로 완화할 수 있습니다. 수술 시간은 약 1시간이며, 많은 경우 당일 퇴원합니다.

준비 방법 (수술 전)

- 전신마취 또는 척추마취로 진행됩니다. 금식 시간과 혈액 희석제(항응고제) 등 복용 중단 지침을 반드시 따르십시오.
- 소변 검사로 감염 여부를 확인(감염 시 치료 후 수술)하고, 방광경 검사(cystoscopy)로 슬링 효과를 사전 확인합니다.
- 금연하고, 체중과 당뇨를 관리하며, 처방된 항생제를 복용하십시오. 슬링은 메시 삽입물이므로 감염 예방이 중요합니다.

다음에 해당하면 미리 의료진에게 알려십시오:

- 골반 방사선 치료 경험이 있는 경우 — 슬링 효과가 떨어질 수 있으며, AUS가 더 적합할 수 있음
- 이전에 요실금 수술이나 요도 협착 치료를 받은 경우
- 어느 부위든 감염이 있는 경우

수술 과정

- 1 마취 후 항생제를 투여합니다. 전신마취 시 잠든 상태, 척추마취 시 허리 아래 감각이 없어집니다.
- 2 서혜부와 회음부(음낭과 항문 사이)에 소절개를 내어 메시 슬링을 요도 아래로 통과시키고 들어 올려 고정합니다.
- 3 슬링을 고정한 후 절개 부위를 봉합하고, 보통 짧은 기간 도뇨관을 삽입합니다.

수술 후

- 서혜부와 회음부에 통증·부기·멍이 1~2주간 지속됩니다. 얼음찜질, 음낭 지지대, 진통제를 사용하십시오.
- 수주간(보통 약 6주) 무거운 물건 들기, 힘주기, 자전거 타기, 성생활을 삼가하십시오. 슬링이 자리 잡기 전에 힘을 주면 느슨해질 수 있습니다.
- 일시적인 소변 막힘이 생길 수 있어 잠깐 도뇨관이 필요할 수 있으며, 대개 저절로 해결됩니다.
- 처음에는 패드를 계속 사용하십시오. 이후 몇 주에 걸쳐 서서히 개선됩니다. 조작할 장치가 없으며, 회복 후에는 정상적으로 소변을 봅니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 소변이 전혀 나오지 않는 경우
- 발열·오한 또는 절개 부위의 발적·통증·분비물이 심해지는 경우
- 서혜부 또는 회음부 통증이 악화되는 경우

기억할 세 가지

1. 남성 요도 슬링은 요도 아래에 메시 띠를 삽입하여 요도를 지지함으로써 전립선 절제 후 요실금을 개선합니다. 조작할 장치가 없습니다.
2. 경증~중등도 요실금에 가장 효과적입니다. 중증 요실금이거나 방사선 치료 후에는 AUS가 더 적합하며, 필요 시 나중에 시행할 수 있습니다.
3. 수술 후 슬링이 자리 잡을 때까지 수주간 무거운 물건 들기, 힘주기, 자전거 타기, 성생활을 삼가십시오. 소변이 전혀 나오지 않거나 감염 징후가 있으면 즉시 연락하십시오.