

굴곡형 음경 보형물(반경성 보형물)은 음경 내부에 삽입하는 두 개의 단단하고 구부러지는 막대로, 약물·주사·기타 치료로 발기부전(ED)이 개선되지 않은 남성에게 사용됩니다. 펌프가 없어 간단합니다. 성관계 시에는 음경을 위로 구부리고, 평상시에는 아래로 구부려 숨기면 됩니다. 이 안내문은 작동 원리, 준비 방법, 수술 후 경과를 설명합니다.

이 수술에 대하여

약물, 진공 기기, 주사 등으로도 **발기부전(ED)**이 개선되지 않을 때, 보형물 수술이 가장 신뢰할 수 있는 다음 단계입니다. 굴곡형 보형물은 가장 단순한 종류로, 부드러운 코팅의 구부러지는 막대 두 개를 음경 안에 삽입합니다. 항상 성관계에 충분한 강도를 유지하며, 손으로 위치를 조정합니다:

- 성관계 시 **위로** 구부립니다
- 평상시에는 **아래로** 구부려 옷 속에 숨깁니다

펌프, 저장조, 액체가 없어 **사용이 가장 간단하고 내구성이 가장 높은** 보형물입니다. 손의 힘이 약한 경우 등에 적합한 선택입니다.

알아야 할 사항

모든 음경 보형물과 마찬가지로, 이것은 **영구적인 선택**입니다. 삽입 후에는 해면체 조직이 변형되어 자연 발기와 다른 ED 치료(약물, 주사)가 더 이상 효과를 보이지 않습니다. 그러나 **배뇨, 감각, 오르가슴, 사정에는 영향을 주지 않습니다**. 팽창형 보형물과 비교한 주요 차이점: 음경이 항상 단단한 상태를 유지하므로 숨기기가 다소 어렵고 자연 발기와 느낌이 다를 수 있지만, 더 단순하고 오래 사용할 수 있습니다.

용어 설명

발기부전(ED)

성관계에 충분한 발기를 얻거나 유지하기 어려운 상태.

음경 보형물

다른 치료가 효과 없을 때 발기를 가능하게 하기 위해 음경에 삽입하는 기기.

굴곡형 / 반경성

음경을 항상 단단하게 유지하는 구부러지는 보형물. 펌프 없이 손으로 위치를 조정합니다.

팽창형 보형물

다른 주요 종류 — 펌프로 부풀리고 빼는 방식. 더 자연스럽지만 부품이 많습니다.

은폐

음경을 아래로 구부려 옷 속에서 보형물이 눈에 띄지 않게 하는 것.

전신마취

수술 중 수면 상태와 무통을 유지하게 하는 마취.

내구성

오래 사용 가능 — 액체 부품이 없어 마모나 고장이 적습니다.

아픈가요? 수술은 전신마취 또는 척추마취 하에 진행되므로 수술 중에는 아무것도 느끼지 않습니다. 수술 후 1~2주간 음경과 음낭의 통증, 부기, 멍이 생길 수 있습니다 — 음낭 지지대, 냉찜질, 진통제가 도움이 됩니다. 수술 시간은 짧으며(보통 1시간 이내) 대부분 당일 퇴원합니다. 집도의의 허가 전까지 보형물을 성관계에 사용하지 마세요.

준비 방법 (수술 전)

- **전신마취 또는 척추마취**로 진행됩니다 — 모든 수술 전 지침(금식, 혈액희석제 포함 복용 중단 약물)을 따르세요.
- **보형물 수술에서 감염 예방은 매우 중요합니다:** 요로감염 등 모든 감염을 먼저 치료해야 합니다. 항균 비누로 샤워하고 항생제를 투여받습니다.
- **흡연·전자담배를 중단하세요.** 당뇨병이 있다면 혈당을 잘 조절하세요 — 둘 다 감염 위험을 낮춥니다.

다음에 해당하면 **미리** 의료진에게 알려주세요:

- 당뇨병 또는 상처 치유에 영향을 주는 질환
- 과거 골반·음경 수술, 방사선 치료, 또는 이전 보형물 삽입 이력

수술 과정

- 1 마취 후 수면 상태 또는 허리 아래가 마비된 상태에서 항생제를 투여합니다.
- 2 작은 절개 하나를 통해 집도의가 음경의 **두 해면체 각각에 굴곡형 막대**를 삽입합니다. 펌프나 저장조는 없습니다.
- 3 절개 부위를 봉합하고 음경을 아래로 향하게 위치시킵니다. 도뇨관을 짧은 시간 동안 삽입할 수 있습니다.

수술 후

- 1~2주간 음경과 음낭의 **부기와 멍**이 예상됩니다. 음낭 지지대를 착용하고, 냉찜질과 진통제를 사용하며, 절개 부위를 깨끗하고 건조하게 유지하세요.
- **집도의의 허가 전까지 성관계에 보형물을 사용하지 마세요** — 보통 치유 완료 후 **4~6주**입니다.
- 치유 후에는 **펌프 조작이 필요 없습니다** — 사용 시 위로, 평상시 아래로 구부리기만 하면 됩니다. 의료진이 방법을 알려드립니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열 또는 오한, 또는 절개 부위의 점점 심해지는 발적·통증·부기·분비물
- 소변을 볼 수 없는 경우
- 심한 또는 악화되는 통증, 또는 음경이 검푸르게 보이는 경우

기억할 세 가지

1. 굴곡형 보형물은 음경에 삽입하는 두 개의 구부러지는 막대입니다 — 성관계 시 위로, 평상시 아래로 구부립니다. 펌프가 없어 가장 단순하고 내구성이 높은 종류입니다.
2. **영구적인 선택**입니다(이후 자연 발기와 약물·주사 치료는 효과 없음). 단, **배뇨, 감각, 오르가슴, 사정에는 영향 없습니다.**
3. 감염 예방이 가장 중요합니다: 감염을 먼저 치료하고, 흡연하지 말고, 당뇨를 조절하며, 항균 비누와 항생제를 사용하세요. 집도의 허가 전까지 (약 4~6주) 성관계에 사용하지 마세요.