

중부요도 슬링 (복압성 요실금 치료)

환자 안내문 · 복압성 요실금을 위한 빠르고 효과적인 수술

WARWIKI

중부요도 슬링은 여성 복압성 요실금 — 기침, 웃음, 무거운 물건을 들거나 운동 시 소변이 새는 증상 — 에 대한 가장 흔한 수술입니다. 부드러운 그물망(메시) 테이프를 요도 중간 아래에 삽입하여 복압이 올라갈 때 요도가 닫힌 상태를 유지하도록 지지합니다. 대부분 당일 귀가 가능하며, 효과가 높고 오래 지속됩니다.

이 수술에 대하여

질(vagina) 내부의 작은 절개를 통해 얇은 테이프를 **장력 없이(tension-free)** 요도 중간 아래에 해먹처럼 위치시킵니다. 기침이나 힘을 줄 때 요도가 슬링을 눌러 닫힌 상태를 유지합니다. 이후 **별도 조작이 필요 없고** 저절로 작동합니다. 삽입 경로는 치골후방(retropubic), 경폐쇄공(transobturator), 단일 절개 “미니” 슬링 등이 있으며, 집도의가 가장 적합한 방법을 선택합니다.

메시(그물망)에 대하여

합성 중부요도 슬링은 여성 건강 분야에서 **가장 많이 연구된** 시술 중 하나로, 장기적인 안전성과 성공률이 우수합니다. FDA 경고를 받은 **탈출증(prolapse) 치료용 질내 삽입 메시와는 다릅니다**. 합성 메시 사용을 원하지 않으신다면, **본인의 조직**으로 만든 자가 근막 슬링(autologous fascial sling)도 선택 가능합니다.

용어 설명

복압성 요실금

기침, 웃음, 무거운 물건을 들 때 소변이 새는 증상.

중부요도 슬링

요도 중간을 받쳐 주는 메시 테이프.

장력 없는 삽입

슬링이 요도를 조이지 않고 아래에서 받쳐 주는 방식.

치골후방 / 경폐쇄공

슬링이 지나가는 두 가지 경로; 모두 효과적.

자가 슬링

메시 대신 본인의 조직으로 만든 슬링.

메시 노출

메시 일부가 밖으로 드러나는 드문 합병증; 치료 가능.

아픈가요? 전신마취 또는 척추마취 하에 시행하므로 수술 중 통증은 없습니다. 보통 30분 이내에 끝나며, **당일 귀가**가 가능합니다. 가벼운 불편감이 있을 수 있으나 대부분 빠르게 일상생활로 복귀합니다.

준비 방법

- **마취 지침**을 따르세요(금식, 혈액 희석제 복용 중단 등 의료진 지시에 따름).
- 감염 여부 확인을 위한 **소변 검사**; 경우에 따라 방광 기능 검사를 먼저 시행할 수 있습니다.
- 귀가를 도와줄 분을 미리 준비하고, 수술 후 2주 정도 가벼운 활동만 계획하세요.

수술 과정

- 1 마취 후 항생제를 투여합니다.
- 2 질 내부를 작게 절개하고 테이프를 요도 중간 아래에 장력 없이 위치시킵니다.
- 3 작은 출구(치골 위 또는 사타구니)는 저절로 아물고, 질 절개 부위는 봉합합니다.
- 4 귀가 전 소변을 정상적으로 볼 수 있는지 확인합니다.

수술 후

- 가벼운 불편감과 약간의 출혈은 정상입니다.
- **약 6주간 무거운 물건 들기, 힘주기, 성관계를 피하세요.**
- 처음에 소변 배출이 느릴 경우 일시적으로 도뇨관이 필요할 수 있습니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 소변을 **전혀 볼 수 없거나** 방광이 충분히 비워지지 않는 느낌
- 발열 또는 심한 출혈
- 통증이 심해지거나, 이후 성관계 시 통증 또는 질 분비물 (메시 문제 가능)

기억할 세 가지

1. 중부요도 슬링은 요도를 받쳐 복압성 요실금을 막는 수술로, 빠르고 당일 귀가 가능하며 효과가 높습니다.
2. 이 메시는 안전성이 충분히 검증되었으며, 회수된 탈출증 메시와는 다릅니다. 원하시면 자가 조직 슬링도 가능합니다.
3. 6주간 무거운 물건과 성관계를 피하고, 소변이 안 나오거나 발열·통증·분비물이 생기면 의료진에게 연락하세요.