

야간뇨(Nocturia)는 수면 중 한 번 이상 소변을 보기 위해 깨는 증상입니다. 나이가 들수록 매우 흔하지만, 그냥 받아들이야 하는 것은 아닙니다. 야간뇨는 수면을 방해하고, 낮 동안 피로를 유발하며, 야간 낙상 위험을 높입니다. 원인만 찾으면 대부분 치료할 수 있습니다.

이 질환에 대하여

야간에 소변을 보기 위해 깨는 주요 원인은 세 가지이며, 많은 경우 **복합적으로** 작용합니다.

- **야간에 소변이 너무 많이 만들어지는 경우** (야간 다뇨) — 저녁 수분 섭취, 카페인·알코올, 다리 부기, 심장·신장 문제, 수면 무호흡증, 이뇨제 등이 원인입니다.
- **방광 용량이 감소한 경우** — 과민성 방광이나 전립선비대(BPH)가 원인일 수 있습니다.
- **수면 장애** — 다른 이유로 깬 후 소변을 보게 되는 경우입니다.

왜 중요한가요

수면 부족 외에도, 야간에 일어나는 것은 노인의 **낙상 및 골절**의 주요 원인입니다. 야간뇨는 치료 가능한 문제(수면 무호흡증이나 심장 문제 포함)를 나타낼 수 있으므로, 그냥 지나치지 말고 평가를 받는 것이 좋습니다.

용어 설명

야간뇨(Nocturia)

수면 중 소변을 보기 위해 깨는 증상.

야간 다뇨(Nocturnal polyuria)

하루 소변량의 상당 부분이 밤에 만들어지는 상태.

배뇨 일지(Frequency-volume chart)

낮과 밤의 배뇨 시간과 양을 기록하는 일지.

과민성 방광(Overactive bladder)

강한 요의를 자주 느끼고 방광 용량이 줄어든 상태.

수면 무호흡증(Sleep apnea)

야간 소변량을 늘릴 수 있는 수면 중 호흡 장애.

데스모프레신(Desmopressin)

일부 환자에서 야간 소변량을 줄이는 약물.

첫 번째 단계: 배뇨 일지 작성 며칠간 **배뇨 일지**를 작성하세요 — 낮과 밤에 언제, 얼마나 마시고 소변을 보는지 기록하면 가장 도움이 됩니다. 이 일지는 의료진이 야간뇨의 **원인**을 파악하고, 알맞은 치료를 결정하는 데 핵심이 됩니다.

진단 방법

- 배뇨 일지와 수분 섭취량, 복용 약물, 수면 습관 검토
- 소변 검사와 전립선비대 또는 과민성 방광 여부 확인
- 필요 시 **다리 부기, 수면 무호흡증**, 심장·신장 원인 선별 검사

치료 방법

- 1 **저녁 생활 습관 조절** — 잠자리에 들기 3~4시간 전부터 수분, 카페인, 알코올 섭취를 줄이세요.
- 2 **다리 부기 관리** — 오후에 다리를 올리고 압박 스타킹을 착용하며, 이뇨제는 의사의 지시에 따라 낮에 복용하세요.
- 3 **방광 원인 치료** — 과민성 방광이나 전립선비대를 치료합니다.
- 4 **약물 또는 수면 치료** — 야간 소변 과다 생성에는 데스모프레신, 수면 무호흡증에는 해당 치료를 시행합니다.

야간 안전 관리

- 야간등을 켜고 화장실까지 통로를 정리하여 낙상을 예방하세요.
- 혈압약을 복용 중이라면 천천히 일어나세요.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- **혈뇨**, 배뇨 시 작열감, 또는 발열 (감염 의심)
- 데스모프레신 복용 중: **메스꺼움, 두통, 또는 혼란** (저나트륨혈증 가능성)
- 부기, 호흡 곤란, 또는 소변량의 급격한 변화

기억할 세 가지

1. 야간뇨는 흔한 증상으로 수면을 방해하고 낙상 위험을 높이지만, 대부분 치료 가능한 원인이 있습니다.
2. 며칠간의 배뇨 일지 작성은 원인과 적절한 치료를 찾는 핵심 첫 단계입니다.
3. 저녁 수분 섭취를 조절하고, 다리 부기와 방광·수면 원인을 치료하세요. 야간등과 깨끗한 통로로 낙상을 예방하세요.