

과민성 방광(OAB)은 방광 근육이 적절하지 않은 때에 수축하는 흔하고 치료 가능한 질환입니다. 이로 인해 갑작스럽고 강한 요의, 빈번한 화장실 방문, 야간뇨, 그리고 때로는 화장실에 도착하기 전 소변이 새는 증상이 나타납니다. 이는 노화의 정상적인 현상이 아니며, 다양한 방법으로 증상을 개선할 수 있습니다.

이 질환에 대하여

정상적인 방광은 차분하게 소변을 채우다가 어느 정도 차면 신호를 보냅니다. OAB에서는 방광이 너무 이르거나 너무 강하게 “급박한” 신호를 보냅니다. 주요 증상은 다음과 같습니다:

- **절박뇨** — 갑자기 참기 어려운 강한 요의
- **빈뇨** — 하루 약 8회 이상 소변을 보는 것
- **야간뇨** — 밤에 소변을 보러 깨는 것
- **절박성 요실금** — 화장실 가는 도중 소변이 새는 것

원인

단일한 원인이 없는 경우가 많으며, 방광과 뇌 사이의 신호 전달 문제입니다. **카페인과 알코올**, 변비, 과체중, 일부 약물, 여성의 경우 폐경이 증상을 유발하거나 악화시킬 수 있습니다. 요로감염(UTI)도 동일한 증상을 일으킬 수 있으므로 먼저 검사합니다. 때로는 신경 질환이 관련될 수 있습니다.

용어 설명

과민성 방광(OAB)

방광이 너무 일찍 수축하여 생기는 절박뇨와 빈뇨.

절박뇨

갑자기 참기 어려운 강한 요의.

빈뇨

낮 동안 소변을 자주 봐야 하는 상태.

야간뇨

잠에서 깨어 소변을 보는 것.

절박성 요실금

강한 요의와 함께 소변이 새는 것.

방광 일지

음료 섭취, 화장실 방문, 요실금을 기록하는 간단한 일지.

골반저

방광 조절을 돕기 위해 훈련할 수 있는 근육.

방광 훈련

절박뇨를 줄이기 위해 화장실 방문 간격을 점차 늘리는 훈련.

좋아질까요? 네 — 대부분의 환자는 증상이 개선됩니다. 치료는 보통 간단한 생활 습관 변화와 방광 훈련부터 시작하며, 필요한 경우에만 단계를 높입니다. 차이를 느끼는 데 몇 주가 걸릴 수 있으므로 각 단계에 충분한 시간을 두고 의료진과 함께 가장 적합한 방법을 찾으세요.

진단 방법

- 증상 상담 및 **방광 일지** 작성
- 감염 또는 혈뇨 확인을 위한 **소변 검사**
- 방광 배뇨 확인 (간단한 방광 스캔)
- 증상이 불분명하거나 이전 치료가 효과 없을 경우 요역동학 검사 또는 방광경 검사 시행

치료 방법 (단계별)

- 1 생활 습관 개선 및 훈련** — 카페인·알코올 줄이기, 수분 조절, 변비 치료, 체중 감량, **방광 훈련** 및 **골반저근 운동**.
- 2 약물 치료** — 방광 근육을 안정시키는 약.
- 3 고급 치료** — 방광 내 **보톡스** 주사, 또는 **신경 자극**(PTNS 또는 천골 신경조절). 각각 별도 안내문이 있습니다.

OAB와 함께하는 생활

- 며칠간 **방광 일지**를 작성하여 유발 요인을 파악하세요.
- 수분을 꾸준히 조금씩 섭취하세요; 너무 줄이면 소변이 농축됩니다.
- **시간제 배뇨**와 의료진이 알려준 “**절박뇨 조절**” 방법(멈추기, 골반저 수축, 심호흡 후 이동)을 활용하세요.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 소변에 **혈뇨**가 있거나 소변 시 통증·작열감
- 발열, 또는 등·옆구리 통증 (감염 의심)
- 갑자기 **소변을 전혀 볼 수 없는** 경우

기억할 세 가지

1. OAB(절박뇨, 빈뇨, 야간뇨, 때로는 요실금)는 흔하고 치료 가능하며, 노화의 정상적인 현상이 아닙니다.
2. 치료는 단계적으로 진행됩니다: 생활 습관 개선과 방광 훈련, 그다음 약물, 그다음 보톡스 또는 신경 자극.
3. 방광 일지는 유발 요인을 찾는 데 도움이 됩니다. 각 단계에 몇 주를 두세요. 혈뇨, 통증, 발열, 소변이 나오지 않으면 즉시 연락하세요.