

방광 조절을 위한 가장 효과적인 첫 번째 방법 두 가지는 약이나 수술 없이도 가능합니다. 골반저근 운동(케겔 운동)은 소변을 참아 주는 근육을 강화하고, 방광 훈련은 화장실 방문 간격을 늘리도록 방광을 재훈련합니다. 꾸준히 실천하면 복압성 요실금, 절박뇨, 빈뇨에 모두 도움이 되며 — 비용이 없고 안전합니다.

어떻게 도움이 되나요

- **골반저근 운동**은 방광과 요도 아래를 받쳐 주는 근육을 강화하여 기침, 무거운 것 들기, 운동 시 소변이 새는 것을 줄여 주고 절박뇨도 억제합니다.
- **방광 훈련**은 화장실 방문 간격을 점차 늘려 과민성 방광을 안정시키고 빈뇨를 줄여 줍니다.

올바른 근육 찾기

골반저근은 **소변 흐름을 멈추거나** 가스를 참을 때 사용하는 근육입니다. 배, 엉덩이, 허벅지는 긴장시키지 않고, **숨도 참지 않으면서** 그 근육만 조이고 들어 올리세요. (실제로 소변을 멈추어 연습하지 마세요 — 근육 위치를 확인하는 방법일 뿐입니다.) 근육을 찾기 어려우시면 **골반저 물리치료사**의 도움을 받으실 수 있으며, 바이오피드백을 활용하기도 합니다.

용어 설명

골반저

방광, 장, (여성의 경우) 자궁을 받쳐 주는 근육 띠.

케겔 운동

골반저근을 조이고 들어올리는 운동.

방광 훈련

화장실 방문 간격을 점차 늘리는 훈련.

절박뇨 억제

갑작스러운 요의를 가라앉혀 화장실까지 새지 않고 이동하는 기술.

바이오피드백

올바른 근육을 사용하고 있는지 확인해 주는 도구.

골반저 물리치료(PT)

골반저 근육을 전문으로 하는 치료사.

언제쯤 효과가 나타나나요? 꾸준히 실천하면 대부분 약 **6~12주** 후에 호전을 느끼기 시작하며, 지속할수록 더 좋아집니다. 운동처럼 멈추면 효과가 줄어드므로, 매일의 습관으로 만드는 것이 목표입니다.

간단한 일일 루틴

- 1 골반저근을 **조여** 3~5초간 유지한 뒤, 같은 시간 동안 완전히 **이완**하세요.
- 2 **10회** 반복하고, 하루에 **3세트** 실시하세요. 근력이 붙으면 유지 시간을 늘리세요.
- 3 기침, 재채기, 들어올리기 직전에 쓸 수 있도록 **빠르고 강한 조이기**를 몇 회 추가하세요(일명 "The Knack").
- 4 조이기 사이에 완전히 이완하는 것이 조이기만큼 중요합니다.

방광 훈련

- 짧은 **방광 일지**를 작성해 자신의 패턴을 파악하세요.
- 요의가 느껴지면 **멈추고, 골반저를 조이고, 호흡을 가다듬어 요의가 사그라들기를 기다린 뒤** 화장실로 걸어가세요.
- 화장실 방문 간격을 15분씩 늘려 최종적으로 3~4시간 간격을 목표로 하세요.

알아두면 좋은 점

- **어디서든** 할 수 있으며 겉으로 티가 나지 않습니다.
- 강도보다 꾸준함이 중요합니다. 식사 시간이나 신호 대기처럼 일상 단서에 연결해 보세요.
- **골반 통증**이 있거나 골반저가 매우 긴장되어 있다면, 목표는 강화가 아닌 **이완**일 수 있습니다 — 의료진에게 문의하세요.

다음 경우 의료진에게 문의하세요:

- 올바른 근육을 사용하고 있는지 확인이 안 될 때
- 운동 후 **통증이 악화**되거나 압박감이 생길 때
- 몇 달이 지나도 변화가 없을 때

기억할 세 가지

1. 골반저근 운동과 방광 훈련은 요실금, 절박뇨, 빈뇨에 대한 안전하고 무료이며 검증된 첫 번째 치료입니다.
2. 숨을 참지 않고 올바른 근육을 조이고, 조이기 사이에 완전히 이완하며, 방광이 조금 더 기다릴 수 있도록 재훈련하세요.
3. 6~12주간 꾸준히 실천하세요. 통증이 심해지거나 근육을 찾기 어렵다면 골반저 물리치료를 문의하세요.