

음경 주름성형술(플리케이션)

환자 안내문 · 음경 만곡(휘어짐) 교정 수술 (페이로니병)

WARWIKI

페이로니병(Peyronie's disease)은 음경 내부에 **흉터(반흔판)**가 생겨 발기 시 음경이 휘어지게 하며, 성관계가 어려워질 수 있습니다. **음경 주름성형술(플리케이션)**은 음경의 긴 쪽에 봉합사를 넣어 살짝 “접어줌”으로써 짧은 쪽과 길이를 맞춰 만곡을 교정합니다. 이 안내문은 수술 원리, 준비 방법, 회복 과정을 설명합니다.

이 수술에 대하여

페이로니병에서는 흉터 조직이 음경 한쪽을 잡아당겨 발기 시 만곡이 생깁니다. 플리케이션은 곡선의 **긴 쪽(바깥쪽)**을 봉합하여 짧아지게 함으로써 양쪽 길이를 맞춰 음경을 펴줍니다. 흉터를 절제하거나 이식편을 사용하지 않으므로 교정 수술 중 **가장 간단하고 발기부전 위험이 가장 낮습니다.**

다음에 해당하면 좋은 선택입니다:

- 만곡 정도가 중등도이며 복잡하지 않은 경우
- **발기 기능이 양호한** 경우 (약 복용 여부 무관)
- 약간의 길이 단축을 감수할 수 있을 만큼 음경 길이가 충분한 경우

알아두어야 할 사항

주요 절충점은 음경의 **짧아짐**으로, 보통 약 1-2 cm입니다. 많은 환자가 이를 과대평가하지만, 만곡이 교정되면 실제 사용 가능한 직선 길이는 이전과 비슷한 경우가 많습니다. 약 **10명 중 9명**이 성관계에 충분한 직선 발기를 얻습니다. 피부 아래에서 **봉합사가 만져질 수 있으나**(흔하며 대개 불편하지 않음) 목표는 완벽한 직선이 아닌 편안한 성관계가 가능한 상태입니다.

용어 설명

페이로니병

음경 내 흉터로 발기 시 만곡이 생기는 질환.

반흔판(플라크)

만곡을 일으키는 흉터 조직 덩어리.

플리케이션

긴 쪽을 봉합·단축하여 음경을 펴는 수술.

인위적 발기

수술 중 주사로 발기를 유발하여 만곡 정도를 확인하는 것.

포피환절술(할례)

포피 제거 수술로, 포피가 있는 경우 동시에 시행될 수 있음.

진공 장치

회복 중 길이 유지와 발기 회복을 돕기 위해 사용하는 펌프.

전신마취

수술 중 완전히 잠들게 하고 통증을 없애는 마취.

아픈가요? 수술은 전신마취, 척추마취 또는 국소마취 하에 진행되므로 수술 중에는 통증이 없습니다. 이후 1-2주간 부기, 멍, 통증이 있을 수 있으며 냉찜질, 지지 속옷, 진통제가 도움이 됩니다. 수술은 대개 약 한 시간이며 당일 귀가가 가능합니다. 도뇨관이 잠시 삽입될 수 있습니다.

준비 방법 (수술 전)

- **전신마취, 척추마취 또는 국소마취**로 진행됩니다 — 금식, 항응고제를 포함한 약 중단 등 수술 전 지침을 따르십시오.
- 페이로니병이 **안정된 상태**여야 합니다(만곡과 통증이 수개월간 변화 없음) — 적절한 수술 시기는 집도의가 확인합니다.
- **금연하십시오.** 감염이 있으면 먼저 치료하며, 항생제를 투여합니다. 포피가 있는 경우 동시에 포피환절술을 시행할 수 있으니 집도의에게 문의하십시오.

다음에 해당하면 **미리** 의료진에게 알려주십시오:

- 발기 기능이 약하거나 발기 관련 약을 복용 중인 경우
- 항응고제를 복용하거나 이전에 음경 수술을 받은 경우

수술 과정

- 1 마취 후 항생제를 투여합니다.
- 2 주사로 발기를 유발하여 만곡을 확인한 뒤, 긴 쪽에 봉합사를 넣어 음경을 펴줍니다.
- 3 다시 발기를 유발하여 결과를 확인하고 피부를 봉합합니다(필요 시 포피환절술 동시 시행).

수술 후

- 1-2주간 **부기, 멍, 통증**이 예상됩니다. 냉찜질, 지지 속옷, 진통제를 사용하고 청결을 유지하십시오.
- 도뇨관이 삽입된 경우 보통 수술 다음 날 아침 제거합니다.
- 회복을 위해 **약 4-6주간 성관계를 삼가십시오.**
- 의료진의 지시에 따라 회복 중 **저용량 발기 치료제**와 **진공 장치**를 매일 사용하면 길이와 발기 유지에 도움이 됩니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열 또는 오한, 또는 상처 부위의 발적·통증·부기·분비물 악화
- 소변을 볼 수 없는 경우
- 심한 부기나 통증의 악화, 또는 심한 출혈

기억할 세 가지

1. 플리케이션은 음경의 긴 쪽을 봉합하여 만곡을 교정합니다 — 흉터 절제나 이식편 없이 가장 간단하게 시행하며 발기부전 위험이 가장 낮습니다.
2. 절충점은 약간의 **짧아짐**(보통 1-2 cm)이지만, 만곡 교정 후 실제 사용 길이는 이전과 비슷한 경우가 많습니다. 약 10명 중 9명이 충분히 직선화된 발기를 얻으며, 봉합사가 피부 아래에서 만져질 수 있습니다.
3. 페이로니병이 안정된 후 수술을 받고, 금연하십시오. 수술 후 약 4-6주간 성관계를 삼가고 회복 계획(치료제/진공 장치)을 따르십시오. 발열, 심한 부기, 배뇨 곤란 시 연락하십시오.