

음경 견인 치료는 음경에 부드럽고 지속적인 견인력을 적용하는 기구를 사용합니다. 주로 페이로니병(만곡 감소 및 길이 보존)에 사용되며, 보형물 수술 후 길이 유지 등 음경 재활 목적으로도 활용됩니다. 비수술적이고 안전하지만, 수개월간 매일 꾸준히 사용해야 효과를 볼 수 있습니다.

작용 원리

지속적이고 부드러운 장력이 조직과 흉터(플라크)를 서서히 **재형성**하여 만곡을 줄이고 길이를 유지하는 데 도움을 줍니다. 효과는 점진적이고 완만합니다 — 빠른 해결책이 아닌 꾸준한 치료입니다. 다른 페이로니병 치료와 병행하는 경우가 많습니다.

기대할 수 있는 결과

- 해당 기구의 사용 지침에 따라 **매일 정해진 시간** 동안 착용합니다(모델에 따라 장시간 착용 또는 하루 수 회 단시간 사용 방식이 있습니다).
- 효과는 **수개월**에 걸쳐 나타납니다 — 꾸준함이 핵심입니다.
- 페이로니병의 **활성기**에 사용하거나 다른 치료와 병행할 때 효과가 좋습니다.

용어 설명

견인 치료

기구로 음경을 장기간 부드럽게 늘이는 치료법.

페이로니병

음경을 구부리는 흉터 조직 — 견인 치료의 주된 적응증.

플라크

견인으로 재형성하는 흉터 조직.

음경 재활

보형물 수술 후 등에서 길이·기능을 유지하는 것.

활성기 vs. 안정기

페이로니병 만곡이 아직 변하고 있는지, 고정되었는지를 나타냄.

정말 효과가 있나요? 꾸준히 수개월간 사용하면 만곡과 길이에 **실질적인 개선**을 기대할 수 있습니다. 음경을 위한 물리치료처럼 점진적이며 꾸준함에 달려 있습니다. 심한 만곡을 단독으로 완전히 교정하지는 못하며, 주사 치료나 수술과 병행하면 더욱 효과적입니다.

안전하게 사용하기

- 1 기구의 **착용 시간 및 장력** 지침을 정확히 따르고 — 절대 과도하게 조이지 마세요.
- 2 이완된 상태의 음경에 착용하고, **무감각, 색 변화, 통증**이 생기면 즉시 중단하세요.
- 3 익숙해질 때까지 착용 시간을 서서히 늘려 가세요.
- 4 기구를 청결하게 유지하고, 지시된 대로 휴식을 취하세요.

알아두세요

- 가정에서 눈에 띄지 않게 사용할 수 있으며, 많은 환자가 다른 페이로니병 치료와 병행합니다.
- 인내가 필요합니다 — 효과는 며칠이 아닌 수개월 단위로 평가하세요.
- 어떤 기구와 일정이 적합한지 의료진에게 문의하세요.

다음 증상이 있으면 중단하고 의료진에게 연락하세요:

- 음경의 **무감각** 또는 차갑거나 창백하거나 푸르스름한 색이 빠르게 회복되지 않는 경우
- 지속적인 통증, 피부 손상, 또는 상처
- 만곡 악화 또는 새로운 종괴(혹) 발생

흔한 반응

- 기구가 닿는 부위의 일시적인 발적 또는 자국
- 적응하면서 완화되는 가벼운 불편감

기억할 세 가지

1. 음경 견인 치료는 음경을 부드럽게 늘여 페이로니병 만곡을 줄이고 길이를 보존합니다 — 비수술적이고 안전합니다.
2. 수개월간 매일 꾸준히 사용해야 효과가 나타납니다. 결과는 점진적이며, 다른 치료와 병행하는 경우가 많습니다.
3. 절대 과도하게 조이지 마세요. 무감각, 색 변화, 지속적인 통증이 있으면 중단하고 의료진에게 연락하세요.