

# 경피적 경골신경 자극술 (PTNS)

환자 안내문 · 발목 신경 자극을 통한 과민성 방광 치료

WARWIKI

PTNS는 과민성 방광 — 절박뇨, 빈뇨, 절박성 요실금 — 을 위한 약물 없는 외래 시술입니다. 발목 근처에 가는 바늘을 삽입하여 경골신경에 약한 전기 자극을 전달합니다. 경골신경은 방광을 조절하는 신경과 같은 경로를 공유하므로, 반복 시술로 방광 신호를 안정시킵니다.

## 작용 원리

발목 안쪽의 경골신경은 방광을 지배하는 척수 신경과 연결됩니다. 이를 약하게 자극하면 방광의 과활동을 **재훈련**하고 **안정**시켜 절박뇨와 빈뇨를 줄여 줍니다. 약물을 사용하지 않으므로 전신 부작용이 없습니다.

## 이 시술이 적합한가요?

- 생활습관 개선만으로 부족하고 **약물을 피하고 싶은** 분 (또는 약 부작용이 있는 분)
- 약물을 복용할 수 없는 분에게 유용한 약물 없는 대안
- 효과를 보려면 **반복 시술에 대한 꾸준한 참여**가 필요합니다

### 용어 설명

#### 과민성 방광

방광이 너무 일찍 수축하여 생기는 절박뇨와 빈뇨.

#### 경골신경

발목 근처에 있으며 방광 신경 공급과 연결된 신경.

#### 신경조절

약한 전기 신호로 과활동 신경을 안정시키는 방법.

#### 경피적

가는 바늘 전극을 통해 피부를 통과하는 것.

#### 유지 치료

효과를 유지하기 위한 간헐적 후속 시술.

**아픈가요?** 대부분 발가락이 살짝 오므라드는 듯한 가벼운 저림이나 박동감만 느낍니다 — 통증은 없습니다. 시술은 편안하게 앉아서 약 **30분** 진행하며, 시술 직후 운전하고 일상생활로 바로 돌아갈 수 있습니다.

## 시술 과정

- 1 다리를 받친 자세로 앉으면, 발목 안쪽 근처에 **매우 가는 바늘 전극**을 삽입합니다.
- 2 소형 기기가 약 30분 동안 **약한 전기 자극**을 전달합니다.
- 3 시술 후 바늘을 제거하며 — 방문 사이에 몸에 남는 것은 없습니다.

## 시술 일정

- 보통 **주 1회 시술로 12주**를 먼저 진행합니다.
- 효과가 있는 분은 이후 **간헐적 유지 치료**로 효과를 지속합니다.
- 일부 기관에서는 장기적인 가정 내 자극을 위한 **삽입형** 경골신경 기기도 사용 가능합니다.

## 알아두세요

- **12주 전 과정을** 완료하세요 — 효과는 시술이 쌓일수록 커집니다.
- 약물, 수술, 회복 기간이 없습니다.
- 지속적인 시술이 필요하며, 중단하면 효과가 줄어들 수 있습니다.

### 다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발목 시술 부위에 발적, 부기, 분비물이 생길 때
- 발열이 있거나 시술 후 발목 통증이 심할 때
- 방광 증상이 갑자기 악화될 때

## 기억할 세 가지

1. PTNS는 발목의 경골신경을 약하게 자극하여 과민성 방광을 안정시키는 약물 없는 시술로, 전신 부작용이 없습니다.
2. 보통 주 1회 시술, 12주 진행 후 유지 치료를 받으며, 매 시술은 약 30분이고 통증이 없습니다.
3. 전 과정을 완료하고 효과 유지를 위해 지속적인 유지 치료를 계획하세요.