

3도 및 4도 회음부 열상

환자 안내문 · 중증 분만 열상 — 봉합 및 회복

WARWIKI

질식 분만(출산) 중 질과 항문 사이의 부위(회음부)가 찢어질 수 있습니다. 3도 열상은 항문 괄약근까지 이어지며, 4도 열상은 괄약근을 관통하여 직장 점막까지 도달합니다. 이를 통틀어 산과적 항문괄약근 손상(OASIS)이라고 합니다. 분만 직후 세심하게 봉합하며, 적절한 회복 관리를 받으면 대부분 잘 회복됩니다.

어떤 일이 생겼나요

항문 괄약근은 가스와 대변을 조절하는 고리 모양의 근육입니다. 중증 열상은 이 근육에 영향을 미치므로, 장기적인 배변 조절 기능을 보호하기 위해 세심한 봉합과 추적 관찰이 중요합니다. 이 열상은 본인의 잘못이 아니며, 특정 행동으로 인해 발생하는 것이 아닙니다.

봉합 과정

봉합은 분만 직후 수술실 또는 분만실에서 충분한 마취(주로 척추마취 또는 경막외마취)하에 시행합니다. 집도되는 조직을 **층별로** 재건합니다 — 괄약근을 이어 붙이고, 4도 열상의 경우 직장 점막까지 봉합합니다 — 흡수성 봉합사를 사용합니다. 항생제와 통증 조절 및 배변 관리 계획도 함께 제공됩니다.

용어 설명

회음부

질과 항문 사이의 부위입니다.

OASIS

산과적 항문괄약근 손상 — 3도 또는 4도 열상입니다.

항문 괄약근

가스와 대변을 조절하는 근육 고리입니다.

3도 열상

항문 괄약근까지 찢어진 열상입니다.

4도 열상

괄약근을 관통하여 직장 점막까지 이어진 열상입니다.

변비완화제

회복 중 힘을 주지 않도록 대변을 부드럽게 유지하는 약입니다.

골반저 물리치료

회복 후 근력과 조절 능력을 재건하는 치료입니다.

후유증이 남을까요? 대부분의 환자는 잘 회복되어 정상적인 배변 조절 기능을 되찾습니다. 일부에서 가스나 대변 조절에 어려움을 느끼는 경우가 있으므로, 추적 관찰과 골반저 물리치료가 중요합니다. 증상이 지속될 경우 효과적인 치료법이 있으니, 새는 증상이 있다면 기다리지 말고 의료진에게 알려주세요.

회복 & 자가 관리

- 1 **대변을 부드럽게 유지하세요** — 처방된 변비완화제를 복용하고, 수분을 충분히 섭취하며 섬유질을 드셔서 힘주는 일이 없도록 하세요.
- 2 **통증 조절 & 위생 관리** — 처방된 진통제를 사용하고, 화장실 사용 후 따뜻한 물로 행구어 해당 부위를 청결하고 건조하게 유지하세요.
- 3 **충분한 휴식과 단계적 회복** — 아기 외의 무거운 물건 들기를 피하고, 몇 주에 걸쳐 서서히 호전됨을 기대하세요.
- 4 **골반저 물리치료** — 초기 회복이 진행되면 근력 재건에 도움이 됩니다.

추적 관찰 & 이후 분만

- 봉합 부위 회복 상태와 배변 조절 기능을 확인하는 진료를 받게 됩니다.
- **다음 분만 방법**에 대해 의료진과 상담하세요 — 가장 안전한 분만 방법을 안내받게 됩니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열, 통증 악화, 또는 악취 나는 분비물 (감염 가능성)
- 봉합 부위가 벌어지는 것처럼 보일 때
- 가스나 대변이 새거나 조절이 어려워질 때
- 심한 변비 또는 배변 불가 시

알아두면 좋은 것들

- 편안하게 앉으세요 (방석이 도움이 됩니다). 초기에는 얼음찜질로 부기를 줄이세요.
- 의료진의 허락 없이 좌약이나 관장은 사용하지 마세요.

기억할 세 가지

1. 3도 또는 4도 열상(OASIS)은 항문 괄약근에 영향을 미치며, 분만 직후 총별로 봉합합니다.
2. 대변을 부드럽게 유지하고, 봉합 부위를 잘 관리하며, 골반저 물리치료를 받으세요 — 대부분 잘 회복됩니다.
3. 가스나 대변이 새거나, 발열이 있거나, 봉합 부위가 벌어지면 즉시 의료진에게 알려주세요 — 조기 치료가 더 좋은 결과로 이어집니다.