

페이로니병(Peyronie's disease)은 음경 벽에 흉터 조직 덩어리인 플라크(경결)가 형성되어 음경이 만곡되거나, 좁아지거나, 함몰되거나, 짧아지는 상태이며, 발기 시 통증이 생기기도 합니다. 성관계를 어렵게 할 수 있습니다. 흔한 질환이며 암이 아니고, 효과적인 치료법이 있습니다 — 적합한 치료는 병기에 따라 달라집니다.

이 질환에 대하여

페이로니병은 보통 두 단계를 거칩니다:

- **활동기(급성기)** — 만곡이 변하고 있으며 통증이 있을 수 있으며, 흔히 6–18개월간 지속됩니다.
- **안정기** — 만곡과 플라크가 고정되고 통증이 대개 완화됩니다.

치료 방향은 현재 어느 단계인지에 따라 달라지므로, 의료진이 증상 변화에 대해 확인합니다.

원인

성관계 중 경미한 굴곡이나 손상이 생겼을 때 정상 조직 대신 비정상적인 흉터 조직으로 치유되면서 발생하는 것으로 알려져 있습니다. 나이가 많거나, 당뇨병이 있거나, 전립선 수술 후이거나, **뒤꿍트랑 구축**(손에 유사하게 나타나는 섬유 수축 질환)이 있는 남성에게 더 흔합니다.

용어 설명

페이로니병

음경의 흉터 조직으로 인해 만곡이나 변형이 생기는 질환.

플라크(경결)

만곡을 일으키는 흉터 조직 덩어리.

활동기 vs. 안정기

만곡이 아직 변하고 있는지, 아니면 고정되었는지 여부.

견인 치료

음경을 부드럽게 늘려 만곡과 길이를 개선하는 기구.

콜라게나아제(Xiaflex)

플라크를 분해하는 주사 약물.

절첩술 / 이식 수술

음경을 펴는 수술적 방법.

바로 수술을 받아야 하나요? 대개 그렇지 않습니다. **활동기**에는 만곡이 계속 변하므로, 불편감 완화와 비수술적 방법에 집중합니다. 수술은 만곡이 **안정**된 후(만곡이 고정되고 통증이 가라앉은 뒤)에 고려합니다. 많은 남성이 수술 없이 호전됩니다.

진단 방법

- 만곡, 통증, 변화 경과에 대한 문진
- 플라크를 촉진하는 진찰; 발기 시 사진 촬영 또는 진료실 내 평가
- 필요한 경우 초음파로 플라크 위치와 혈류 확인

치료 방법 (단계별)

- 1 **활동기** — 안심 상담, 통증 조절, **견인 치료**; 악화 방지가 목표입니다.
- 2 **플라크 주사** — 콜라게나아제(Xiaflex) 등을 플라크에 주사해 만곡을 줄입니다.
- 3 **수술(안정기)** — **절첩술**(긴 쪽을 봉합; 가장 간단하나 단축 가능)이나 **플라크 절개/이식**(길이 보존; 심한 만곡에 적용).
- 4 **음경 보형물** — 발기부전이 동반된 경우. 각 방법마다 별도 안내문이 있습니다.

알아두세요

- 음경을 강제로 “펴려” 하지 마세요 — 손상이 악화될 수 있습니다.
- 성관계에 지장이 없는 만곡은 경과 관찰만 할 수도 있습니다.
- 페이로니병은 심리와 관계에 영향을 줄 수 있으며, 지지가 도움이 됩니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 성관계가 불가능할 정도의 **만곡** 또는 악화되는 굴곡
- 발기 시 심한 **통증**
- 만곡과 함께 새로 생긴 **발기부전**

기억할 세 가지

1. 페이로니병은 음경을 구부리는 흉터 조직입니다 — 흔하고, 암이 아니며, 치료할 수 있습니다.
2. 치료는 단계에 따라 다릅니다: 활동기에는 비수술적 방법, 안정기에는 교정 시술을 고려합니다.
3. 많은 남성이 수술 없이 호전됩니다. 성관계를 방해하는 만곡, 지속적인 통증, 새로운 발기부전이 있으면 의료진을 찾으세요.