

페이로니병(Peyronie's disease)은 음경 내부에 **흉터(플라크)**가 생겨 발기 시 음경이 휘어지고 성관계가 어려워질 수 있는 질환입니다. 이 수술은 짧고 단단한 쪽의 흉터를 절개(필요 시 일부 제거)하여 만곡을 풀고, 빈 공간을 이식편으로 메우는 방법입니다. 본 안내문은 수술 원리, 준비 방법, 예상되는 경과를 설명합니다.

이 수술에 대하여

흉터 조직(플라크)이 음경 한쪽을 당겨 발기 시 만곡이 생깁니다. 이 수술은 **짧은 쪽(안쪽)**의 흉터를 절개하여 만곡을 해제하고 생긴 공간을 **이식편**—콜라겐 패치, 공여/동물 조직, 또는 자가 조직—으로 채웁니다. 긴 쪽을 단축하는 대신 짧은 쪽을 늘려 **길이 보존**이 가능합니다.

다음 경우에 적합합니다:

- 만곡이 **심하거나 복잡한** 경우 (예: 모래시계형, 힌지형)
- 음경 **길이 보존**이 중요한 경우 (중첩술로는 단축이 과도할 때)
- 발기 기능이 **충분히** 좋은 경우

알아두어야 할 사항

장점은 **길이 보존**(경우에 따라 약간 증가)입니다. 단점은 중첩술보다 **발기부전 위험이 더 높음**—흉터 부위 조작이 혈액 저류 기능에 영향을 줄 수 있기 때문입니다—이므로 발기 기능이 좋은 환자에게만 시행합니다. **귀두 감각 저하**는 초기에 흔하며(수술 중 신경을 살짝 옆으로 이동), 대개 6-12개월 내 회복됩니다. 대부분의 환자가 성관계 가능한 직선 발기를 얻습니다.

용어 설명

페이로니병

음경 내 흉터로 인해 발기 시 만곡이 생기는 질환.

플라크

만곡을 일으키는 흉터 조직 덩어리.

이식편(Graft)

흉터 절개 후 빈 공간을 채우는 얇은 조각—콜라겐 패치, 공여/동물 조직, 또는 자가 조직.

인공 발기

수술실에서 주사로 유발하여 만곡 정도를 확인하는 발기.

포경수술

포피 제거술—포경이 안 된 경우 동시에 시행하는 경우가 많음.

음경 재활

회복 중 발기 기능과 길이를 보호하기 위해 발기 약물 및/또는 진공 기구를 사용하는 것.

전신마취

수술 중 완전히 잠들게 하는 마취.

아픈가요? 수술은 전신마취 또는 척추마취로 진행하므로 수술 중 통증은 없습니다. 이후 1-2주간 음경 부기, 멍, 통증이 있을 수 있으며 냉찜질, 지지대, 진통제가 도움이 됩니다. 이 수술은 중첩술보다 오래 걸리고(보통 1.5-3시간), 하룻밤 입원할 수 있습니다. 도뇨관은 보통 다음 날 아침에 제거합니다.

준비 방법 (수술 전)

- 전신마취 또는 척추마취로 진행하므로 금식 및 혈액희석제 포함 복용 중단 등 수술 지침을 따르세요.
- 페이로니병이 **안정기**에 있어야 하며(만곡과 통증이 수개월간 변화 없음), 수술 전 **발기 기능 평가**가 필요합니다.
- **금연**하세요. 감염이 있으면 먼저 치료하고 항생제를 투여합니다. 포경이 안 된 경우 포경수술을 동시에 시행할 수 있습니다.

다음에 해당하면 **미리 의료진에게 알려주세요:**

- 발기 기능이 약하거나 발기 약물·주사를 사용 중인 경우
- 혈액희석제 복용 중이거나 이전에 음경 수술을 받은 경우

수술 과정

- 1 마취 후 항생제를 투여합니다.
- 2 주사로 **인공 발기를 유발**하여 만곡을 확인하고, 피부를 들어올린 뒤 음경 상부 신경을 조심스럽게 옆으로 이동시킵니다.
- 3 짧은 쪽 흉터를 **절개(필요 시 일부 제거)**하여 만곡을 해제하고 빈 공간을 **이식편**으로 채운 뒤, 결과를 확인하고 피부를 봉합합니다.

수술 후

- 1-2주간 **부기, 멍, 통증**이 있습니다. **귀두 감각 저하**는 흔하며 수개월에 걸쳐 회복됩니다.
- 도뇨관은 보통 수술 다음 날 아침에 제거합니다.
- 이식편이 아물도록 **약 6-8주간 성관계를 삼가세요**.
- 발기 기능과 길이 보호를 위해 **음경 재활**—저용량 발기 약물 및/또는 매일 진공 기구 사용—을 시작하게 됩니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열 또는 오한, 또는 상처 부위의 발적·통증·부기·분비물 악화
- 소변을 볼 수 없는 경우
- 심한 또는 악화되는 부기·통증, 또는 다량 출혈

기억할 세 가지

1. 이 수술은 짧은 쪽 흉터를 절개하고 이식편으로 메워 만곡을 해제합니다—**길이가 보존되며** 심하거나 복잡한 만곡에 사용됩니다.
2. 중첩술보다 **발기부전 위험이 더 높으므로** 발기 기능이 좋은 경우에만 시행하며, 초기 귀두 감각 저하는 흔하고 대부분 회복됩니다.
3. 안정기 확인과 발기 기능 평가가 먼저이며 **금연**이 필수입니다. 수술 후 6-8주간 성관계를 삼가고 음경 재활을 따르세요. 발열, 심한 부기, 배뇨 곤란 시 의료진에게 연락하세요.