

천골질고정술(sacrocolpopexy)은 질 꼭대기(천부) 또는 자궁의 탈출증을 교정하는 가장 내구성 높은 수술 중 하나입니다. 부드러운 메시지를 이용해 질 꼭대기를 들어 올려 꼬리뼈(천골) 위의 강한 인대에 고정함으로써 정상 위치와 깊이를 회복합니다. 보통 복강경 또는 로봇 소절개(키홀) 수술로 시행하며, 성관계 능력을 보존합니다.

## 이 수술에 대하여

**메시** 조각을 질 꼭대기의 앞뒤에 부착한 뒤 **천골** 위의 단단한 인대에 고정합니다. 이를 통해 질이 정상 위치에 유지됩니다. 지속성이 뛰어나 천부 탈출증의 **표준 교정술**로 인정받고 있습니다.

## 메시에 대하여

이 수술에 사용되는 메시는 **복강**을 통해 삽입되며, 안전성이 충분히 연구된 재료입니다. FDA 경고 후 시장에서 퇴출된 **경질(질을 통한) 탈출증 메시**와는 다릅니다. 집도의가 메시 노출 등 소수의 위험성에 대해 설명해 드릴 것입니다.

### 용어 설명

#### 천부 / 질 꼭대기

질의 가장 위쪽 부분. 출산이나 자궁절제술 후 내려앉을 수 있음.

#### 천골

척추 아래쪽 뼈. 이 뼈의 인대가 수술 고정점이 됨.

#### 메시

질 꼭대기를 지지하는 부드러운 영구 소재.

#### 로봇 / 복강경

소절개(키홀)를 통한 최소침습 수술.

#### 메시 노출

메시의 일부가 표면에 드러나는 드문 합병증. 치료 가능.

#### 자궁절제술

자궁 제거. 동시에 시행될 수 있음.

**아픈가요?** 전신마취 하에 시행되므로 수술 중 통증은 없습니다. 소절개 수술의 경우 절개 부위의 가벼운 통증과 가스 불편감이 있을 수 있으며, 당일 또는 하룻밤 입원 후 귀가합니다. 개복 수술은 회복 기간이 다소 더 길 수 있습니다.

## 준비 방법

- **전신마취**로 진행됩니다 — 금식 및 약물 복용 지침(혈액희석제 중단 등)을 따르세요.
- 수술 전 평가가 있으며, **자궁절제술** 또는 요실금 수술을 동시에 시행할 수 있습니다.
- 금연하시고, 귀가 동반자와 가정 내 도우미를 미리 준비하세요.

## 진행 과정

- 1 전신마취 후 항생제를 투여합니다.
- 2 소절개(또는 한 개의 개복 절개)를 통해 메시를 질 꼭대기에 부착합니다.
- 3 메시를 천골 인대에 고정하여 질을 제자리로 올립니다.
- 4 도뇨관을 단기간 삽입합니다.

## 수술 후

- 당일 또는 하룻밤 입원 후 귀가. 처음에는 가벼운 활동만 하세요.
- **약 6주간 무거운 것 들기, 힘주기, 성관계를 삼가세요.**
- 약간의 분비물과 가벼운 불편감은 정상입니다. 변비를 예방하세요.

### 다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열 또는 오한
- 심한 출혈, 복부 또는 골반 통증 악화
- **소변을 볼 수 없거나** 지속되는 구역·구토
- 냄새 나는 질 분비물 또는 성관계 시 통증(메시 문제 가능)

### 기억할 세 가지

1. 천골질고정술은 메시로 질 꼭대기를 천골에 고정하는 수술로, 침부 탈출증의 가장 내구성 높은 치료법입니다(주로 소절개 방식).
2. 복강을 통해 삽입하는 메시는 충분히 연구되었으며, 회수된 경질 탈출증 메시와 다릅니다.
3. 약 6주간 무거운 것 들기와 성관계를 삼가세요. 발열·심한 출혈·배뇨 불능·냄새/통증이 있으면 연락하세요.